4

OPCIÓN B
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Matemáticas

J. Colera, M.^aJ. Oliveira, I. Gaztelu

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Esta serie de **Matemáticas** responde a un proyecto pedagógico creado y desarrollado por Anaya Educación para la ESO. En su elaboración han participado:

Autores: José Colera, M.^a José Oliveira, Ignacio Gaztelu, Leticia Colera Cañas y M.^a Mar Martínez

Coordinación editorial: Mercedes García-Prieto

Edición: Carlos Vallejo

Diseño de cubiertas e interiores: Miguel Ángel Pacheco y Javier Serrano

Tratamiento infográfico del diseño: Javier Cuéllar, Patricia Gómez y Teresa Miguel

Equipo técnico: Coral Muñoz

Corrección: Sergio Borbolla

Ilustraciones: Montse Español y Álex Orbe

Edición gráfica: Olga Sayans

Fotografías: 123RF/Quickimage, Age Fotostock, Archivo Anaya (Candel, C.; Cosano, P.; Martin, J.; Padura, S.; Pérez-Uz, B.; Ruiz, J.B.; Ruiz Pastor, L.; Steel, M.; Zuazo A.H.), Corbis/Cordon Press, NASA.

Las normas ortográficas seguidas son las establecidas por la Real Academia Española en la nueva **Ortografía de la lengua española**, publicada en el año 2010.

Índice

Unidad	Contenidos	Competencias
1 Números reales Página 7	1. Números irracionales ..... 8 2. Números reales ..... 9 3. Intervalos y semirrectas ..... 10 4. Raíces y radicales..... 12 5. Potencias y raíces con la calculadora..... 13 6. Propiedades de los radicales ..... 14 7. Números aproximados. Notación científica... 16	Ejercicios y problemas ..... 18 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 20
2 Polinomios y fracciones algebraicas Página 21	1. Operaciones con polinomios..... 22 2. Factorización de polinomios ..... 25 3. Fracciones algebraicas 27	Ejercicios y problemas ..... 29 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 31
3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas Página 33	1. Ecuaciones de segundo grado..... 34 2. Otros tipos de ecuaciones..... 35 3. Sistemas de ecuaciones lineales..... 37 4. Sistemas de ecuaciones no lineales..... 38 5. Inecuaciones de primer grado 39	Ejercicios y problemas ..... 41 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 43

Unidad	Contenidos	Competencias
4 Funciones. Características Página 45	1. Conceptos básicos..... 46 2. Cómo se presentan las funciones..... 47 3. Funciones continuas. Discontinuidades ..... 49 4. Crecimiento, máximos y mínimos ..... 50 5. Tendencia y periodicidad..... 51	Ejercicios y problemas ..... 52 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 54
5 Funciones elementales Página 55	1. Distintos tipos de funciones lineales..... 56 2. Ecuación de una recta en la forma punto-pendiente ..... 57 3. Parábolas y funciones cuadráticas..... 58 4. Funciones de proporcionalidad inversa y radicales ..... 60 5. Funciones exponenciales..... 61	Ejercicios y problemas ..... 62 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 64
6 La semejanza. Aplicaciones Página 65	1. Semejanza ..... 66 2. Semejanza de triángulos..... 68 3. La semejanza en los triángulos rectángulos... 69 4. Homotecia y semejanza..... 71	Ejercicios y problemas ..... 72 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 74
7 Trigonometría Página 75	1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo ..... 76 2. Relaciones trigonométricas fundamentales..... 77 3. Utilización de la calculadora en trigonometría ..... 79 4. Resolución de triángulos rectángulos 80	Ejercicios y problemas ..... 81 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 82

Unidad	Contenidos	Competencias
8 Geometría analítica Página 83	1. Vectores en el plano ..... 84 2. Operaciones con vectores ..... 85 3. Punto medio de un segmento y puntos alineados ..... 86 4. Ecuaciones de rectas. Paralelismo y perpendicularidad ..... 87 5. Rectas paralelas a los ejes coordenados ..... 89 6. Posiciones relativas de dos rectas ..... 90 7. Distancia entre dos puntos 91	Ejercicios y problemas ..... 92 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 93
9 Estadística Página 95	1. Dos ramas de la estadística ..... 96 2. Tablas de frecuencias ..... 97 3. Parámetros estadísticos: $\bar{x}$ y σ ..... 98 4. Medidas de posición ..... 100 5. Diagramas de caja 101	Ejercicios y problemas ..... 103 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 104
10 Cálculo de probabilidades Página 105	1. Probabilidades en experiencias simples ..... 106 2. Probabilidades en experiencias compuestas .... 108 3. Composición de experiencias independientes ..... 109 4. Composición de experiencias dependientes 110	Ejercicios y problemas ..... 112 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 113
11 Combinatoria Página 115	1. En qué consiste la combinatoria ..... 116 2. El diagrama en árbol ..... 117 3. Variaciones y permutaciones ..... 119 4. Cuando no influye el orden ..... 121 5. Combinaciones 122	Ejercicios y problemas ..... 123 Consolida lo aprendido utilizando tus competencias. Autoevaluación 124

1 Números reales

Los *números irracionales* fueron descubiertos por los pitagóricos aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, más que como números, fueron tomados como magnitudes geométricas. Esta forma de tratarlos se extendió durante casi dos milenios. Es muy reciente, pues, la idea de que estos números, junto con los *racionales*, forman un único conjunto con estructura y características muy interesantes.

El concepto de *número real*, como ahora lo manejamos, se fue concibiendo y construyendo al evolucionar el estudio de las funciones. Finalmente, fue formalizado en 1871 por el alemán **Cantor**.

DEBERÁS RECORDAR

- Cómo expresar un número decimal exacto en forma de fracción.
- Cómo expresar un decimal periódico en forma de fracción.

Números racionales son los que se pueden poner como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es exacta o periódica.

Números irracionales son los no racionales, es decir, los que no pueden obtenerse como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es infinita no periódica. Por ejemplo, $\pi = 3,14159265359\dots$

Hay infinitos números irracionales, algunos de los cuales son especialmente interesantes. Veamos algunos.

La diagonal del cuadrado: el número $\sqrt{2}$

El teorema de Pitágoras nos proporciona el valor de la diagonal de un cuadrado de lado 1:

$$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ es un número irracional.}$$

Otros irracionales expresados mediante radicales

Los números $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$, ..., $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[5]{10}$, ... son irracionales.

En general, si p no es una potencia n -ésima, entonces $\sqrt[n]{p}$ es irracional.

El número de oro: $\Phi = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

SÍMBOLO DE LOS PITAGÓRICOS

La diagonal de un pentágono de lado unidad es el número $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$. Históricamente es el primer número del que se tuvo conciencia de su irracionalidad. En el siglo V a.C., los griegos pitagóricos descubrieron con sorpresa (y casi con espanto) que la diagonal del pentágono y su lado no guardaban una proporción exacta. Hasta entonces se creía que todo el universo se regía por los números naturales y las *razones* entre ellos (fracciones). Pero al descubrir que no era así, les pareció que el caos se asomaba a su mundo. Por eso, llamaron **irracional** (contraria a la razón) a esta relación entre diagonal y lado del pentágono.

Posteriormente, los artistas griegos consideraron que la proporción $\Phi : 1$ resultaba especialmente armoniosa, por lo que la llamaron **razón áurea**, y al número Φ , **número áureo**.

El nombre, Φ (**fi**, letra griega correspondiente a la F), es la inicial de **Fidias**, escultor griego que utilizó asiduamente esta razón.

Construcción del número Φ .

El número π

Como sabes, π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Este número lo conoces y lo utilizas desde hace muchos cursos. Has hecho uso de las siguientes aproximaciones suyas: 3,14 o 3,1416. Su verdadero valor tiene infinitas cifras decimales no periódicas.

π es la letra griega correspondiente a la "p". ¿Por qué este nombre? La palabra griega *perifereia* significa "circunferencia" (la periferia del círculo).

Entrénate

- 1 a) ¿Cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos números enteros?
 -2 ; $1,7$; $\sqrt{3}$; $4,2$; $-3,7\overline{5}$;
 3π ; $-2\sqrt{5}$
- b) Expresa como fracción aquellos que sea posible.
- c) ¿Cuáles son irracionales?
- 2 a) Clasifica en racionales o irracionales los siguientes números:
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$; $0,8\overline{7}$; $-\sqrt{4}$; $-\frac{7}{3}$;
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$; 2π
- b) Ordénalos de menor a mayor.
- c) ¿Cuáles son números reales?

El conjunto formado por los números racionales y los irracionales se llama **conjunto de números reales** y se designa por $\mathbb{R}$. De modo que la tabla sobre números, que ya conocemos, puede ampliarse y completarse del siguiente modo:

Con los números reales podemos realizar las mismas operaciones que se hacen con los racionales: suma, resta, multiplicación y división (salvo por el cero) y se mantienen las mismas propiedades.

También podemos extraer raíces de cualquier índice (salvo raíces de índice par de números negativos) y el resultado sigue siendo un número real. Eso no ocurría con los números racionales.

La recta real

Si en una recta situamos un origen (el cero, 0) y marcamos la longitud unidad, a cada punto le corresponde un número racional o un número irracional. Es decir, *a cada punto de la recta le corresponde un número real*. Por eso, a la recta numérica la llamamos **recta real**.

Ejercicio resuelto

Situar cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Cada uno puede estar en más de un casillero:

$$24; 0,71; 0,7\overline{1}; -5;$$

$$\frac{3}{5}; \sqrt{7}; -\sqrt{9}; \frac{28}{7}; \pi - 1$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	24; $28/7 = 4$
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	24; -5 ; $-\sqrt{9} = -3$; $28/7 = 4$
FRACCIONARIOS	$0,71$; $0,7\overline{1}$; $3/5$
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	24; $0,71$; $0,7\overline{1}$; -5 ; $3/5$; $-\sqrt{9} = -3$; $28/7 = 4$
IRRACIONALES	$\sqrt{7}$; $\pi - 1$

Actividades

- 1 Sitúa cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Ten en cuenta que cada número puede estar en más de un casillero. (HAZLO EN TU CUADERNO).

$$107; 3,95; 3,9\overline{5}; -7; \sqrt{20}; \frac{36}{9}; \sqrt{\frac{4}{9}}; -\sqrt{36}; \frac{7}{3}; \pi - 3$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	
FRACCIONARIOS	
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	
IRRACIONALES	

Intervalo abierto

$$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$$

La expresión anterior se lee así:

Para designar algunos tramos de la recta real, existe una nomenclatura que debes conocer.

Intervalo abierto

El **intervalo abierto** (a, b) es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b , sin incluir ni a ni b : $\{x \mid a < x < b\}$.

Se representa así:

Por ejemplo, el intervalo $(-2, 1)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1 , sin incluir ni -2 ni 1 : $\{x \mid -2 < x < 1\}$.

Su representación es esta:

Intervalo cerrado

El **intervalo cerrado** $[a, b]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b , ambos incluidos: $\{x \mid a \leq x \leq b\}$.

Se representa así:

Por ejemplo, el intervalo $[-2, 1]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1 , incluyendo el -2 y el 1 : $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$.

Su representación es esta:

Intervalo semiabierto

• El **intervalo** $(a, b]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b , incluyendo b pero no a : $\{x \mid a < x \leq b\}$.

Se representa así:

• El **intervalo** $[a, b)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b , incluyendo a pero no b : $\{x \mid a \leq x < b\}$.

Se representa así:

Por ejemplo, el intervalo $(3, 4]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4 , incluyendo el 4 pero no el 3 : $\{x \mid 3 < x \leq 4\}$.

Su representación es esta:

El intervalo $[3, 4)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4 , incluyendo el 3 pero no el 4 : $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$.

Su representación es esta:

Semirrectas y recta real

Semirrectas

- $(-\infty, a)$ son los números menores que a : $\{x / x < a\}$.
- $(-\infty, a]$ son los números menores que a y el propio a : $\{x / x \leq a\}$.
- $(a, +\infty)$ son los números mayores que a : $\{x / x > a\}$.
- $[a, +\infty)$ son los números mayores que a y el propio a : $\{x / x \geq a\}$.

- $(-\infty, 2)$ es el conjunto $\{x / x < 2\}$ →
- $[2, +\infty)$ es el conjunto $\{x / x \geq 2\}$ →

La propia **recta real** se representa en forma de intervalo así: $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

Ejercicios resueltos

1. Escribir en forma de intervalo y representar:

- a) $2 < x \leq 3$ b) $x \leq 1$
c) $x > 0$

1. a) Intervalo semiabierto $(2, 3]$

b) Semirrecta $(-\infty, 1]$

c) Semirrecta $(0, +\infty)$

2. Escribir en forma de desigualdad y representar:

- a) $[-2, 0]$ b) $[-1, +\infty)$
c) $(0, 1)$

2. a) $\{x / -2 \leq x \leq 0\}$

b) $\{x / x \geq -1\}$

c) $\{x / 0 < x < 1\}$

Actividades

1 Escribe los conjuntos siguientes en forma de intervalo y representa los números que cumplen las condiciones indicadas en cada caso:

- a) Comprendidos entre 5 y 6, ambos incluidos.
b) Mayores que 7.
c) Menores o iguales que -5 .

2 Escribe en forma de intervalo y representa:

- a) $\{x / 3 \leq x < 5\}$ b) $\{x / x \geq 0\}$
c) $\{x / -3 < x < 1\}$ d) $\{x / x < 8\}$

3 Escribe en forma de desigualdad y representa:

- a) $(-1, 4]$ b) $[0, 6]$ c) $(-\infty, -4)$ d) $[9, +\infty)$

4 Escribe en forma de intervalo o semirrecta y representa en la recta real los números que cumplen la desigualdad indicada en cada caso:

- a) $-3 \leq x \leq 2$ b) $-1 < x < 5$
c) $0 < x \leq 7$ d) $x > -5$

5 Expresa como intervalo o semirrecta y como una desigualdad cada uno de los conjuntos de números representados.

6 Indica cuáles de los números siguientes están incluidos en $A = [-3, 7)$ o en $B = (5, +\infty)$:

- -3 ; 10 ; $0,5$; 7 ; $\sqrt{5}$; $6,3$

4 Raíces y radicales

Cálculo mental

1. Di el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[3]{k} = 2$ b) $\sqrt[4]{-243} = -3$

c) $\sqrt[4]{k} = \frac{2}{3}$ d) $\sqrt[4]{1024} = 2$

2. Calcula las raíces siguientes:

a) $\sqrt[3]{-8}$ b) $\sqrt[5]{32}$

c) $\sqrt[5]{-32}$ d) $\sqrt[8]{0}$

e) $\sqrt[4]{81}$ f) $\sqrt[3]{125}$

Se llama **raíz n -ésima** de un número a , y se escribe $\sqrt[n]{a}$, a un número b que cumple la siguiente condición:

$$\sqrt[n]{a} = b \text{ si } b^n = a$$

$\sqrt[n]{a}$ se llama **radical**; a , **radicando**, y n , **índice** de la raíz.

Cuando manejes expresiones como esta, habrá ocasiones en las que debes calcular el valor numérico. Para ello, deberás tener en cuenta la definición, como en las que se proponen en este margen, o bien recurrir a la calculadora. Pero en otros casos deberás mantener el radical, simplificarlo, operar con otros radicales, etcétera. Nos dedicaremos a esto en el próximo epígrafe.

Algunas peculiaridades de las raíces

- Si $a \geq 0$, $\sqrt[n]{a}$ existe cualquiera que sea n .
- Si $a < 0$, solo existen sus raíces de índice impar.
- Aunque 4 tiene dos raíces cuadradas, con $\sqrt{4}$ nos referimos a la positiva: $\sqrt{4} = 2$.
En general, un número positivo, a , tiene dos raíces cuadradas: $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$.

Forma exponencial de los radicales

Los radicales se pueden expresar como potencias:

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \text{ pues } (a^{1/2})^2 = a^{2/2} = a$$

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{2/3}, \text{ pues } (a^{2/3})^3 = a^{6/3} = a^2$$

Por ejemplo:

$$\sqrt{5} = 5^{1/2} ; \sqrt[5]{2^3} = 2^{3/5}$$

$$\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

Actividades

1 Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[5]{x}$

b) $\sqrt[3]{x^2}$

c) $\sqrt[15]{a^6}$

d) $\sqrt{a^{13}}$

e) $\sqrt[6]{a^5}$

f) $\sqrt[4]{a^8}$

2 Calcula.

a) $4^{1/2}$

b) $125^{1/3}$

c) $625^{1/4}$

d) $8^{2/3}$

e) $64^{5/6}$

f) $36^{3/2}$

3 Expresa en forma radical.

a) $x^{7/9}$

b) $n^{2/3}$

c) $b^{3/2}$

d) $a^{4/5}$

4 Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[5]{x^2}$

b) $\sqrt{2}$

c) $\sqrt[3]{10^6}$

d) $\sqrt[4]{20^2}$

e) $\sqrt[5]{(-3)^3}$

f) $\sqrt[4]{a}$

g) $(\sqrt[5]{x-2})^3$

h) $\sqrt[15]{a^5}$

5 Pon en forma de raíz.

a) $5^{1/2}$

b) $(-3)^{2/3}$

c) $\left(\frac{4}{3}\right)^{1/3}$

d) $(a^3)^{1/4}$

e) $(a^{1/2})^{1/3}$

f) $(a^{-1})^{3/5}$

Atención

Hay calculadoras antiguas que proceden al revés:

$$\sqrt{247} \rightarrow 247 \sqrt{} \boxed{15.7162336}$$

Potencias y raíces sencillas: x^2 $\sqrt{}$ x^3 $\sqrt[3]{}$

Todas las calculadoras científicas tienen las teclas x^2 y $\sqrt{}$. Muchas tienen también x^3 y $\sqrt[3]{}$, aunque estas suelen aparecer como **segunda función** (es decir, fuera de la tecla y, por tanto, deben ser precedidas por SHIFT).

Por ejemplo:

$$247^2 \rightarrow 247 \boxed{x^2} \boxed{61009} \quad 4,8^3 \rightarrow 4,8 \boxed{x^3} \boxed{110.592}$$

$$\sqrt{247} \rightarrow \sqrt{} \boxed{247} \boxed{=} \boxed{15.71623364}$$

$$\sqrt[3]{4,8} \rightarrow \sqrt[3]{} \boxed{4,8} \boxed{=} \boxed{1.6868653306}$$

Si hay en la pantalla un número cuya raíz cuadrada quieres calcular, antes de dar a la tecla $\sqrt{}$ pulsa = .

Por ejemplo: $\boxed{58403} \boxed{=} \sqrt{} \boxed{=} \boxed{241.667126436}$

Potencias de índice cualquiera: x^y (o bien $x^{\square}$)

$$17,84^5 \rightarrow 17,84 \boxed{x^y} \boxed{5} \boxed{=} \boxed{1807066.97984}$$

$$4^{2,5} \rightarrow 4 \boxed{x^y} \boxed{2,5} \boxed{=} \boxed{32}$$

Raíces de índice cualquiera: $\sqrt[n]{}$ (o bien $\sqrt[n]{}$)

Atención, aquí el orden en que intervienen el índice, el radicando y la tecla dependen mucho de la calculadora. Por ejemplo:

$$\sqrt[5]{32} \rightarrow 5 \sqrt[n]{} \boxed{32} \boxed{=} \boxed{2} \quad \text{PANTALLA SENCILLA}$$

$$\sqrt[5]{32} \rightarrow \sqrt[n]{} \boxed{5} \blacktriangleright \boxed{32} \boxed{=} \boxed{2} \quad \text{PANTALLA DESCRIPTIVA}$$

Incluso hay calculadoras con la tecla $\sqrt[n]{}$. Con ellas se procede así:

$$\sqrt[5]{32} \rightarrow 32 \sqrt[n]{} \boxed{5} \boxed{=} \boxed{2}$$

Cálculo de raíces con la tecla de potencia

$$\sqrt[5]{32} = 32^{1/5} \rightarrow 32 \boxed{x^y} \boxed{1/x} \boxed{=} \boxed{2}$$

$$\sqrt[3]{32^3} = 32^{3/5} \rightarrow 32 \boxed{x^y} \boxed{3} \boxed{\text{abc}} \boxed{5} \boxed{=} \boxed{8}$$

Atención

En algunas calculadoras, en vez de llamar a esta función $\sqrt[n]{}$ se le llama $x^{1/y}$, y actúa así:

$$32 \boxed{x^{1/y}} \boxed{5} \boxed{=} \boxed{2}$$

Actividades

Halla con la calculadora:

1 a) $\sqrt{541}$

b) 327^2

c) $\sqrt[3]{8,53}$

4 Calcula las raíces del ejercicio 2 utilizando la tecla $\sqrt[n]{}$.
(Por ejemplo: $8,24 \boxed{x^y} \boxed{5} \boxed{1/x} \boxed{=} \boxed{}$).

2 a) $\sqrt[5]{8,24}$

b) $\sqrt[6]{586}$

c) $\sqrt[4]{79,46}$

5 Calcula las raíces del ejercicio 3 utilizando la tecla $\sqrt[n]{}$.

3 a) $\sqrt[3]{37^2}$

b) $\sqrt[4]{2,1^5}$

c) $\sqrt[3]{0,008^2}$

(Por ejemplo: $37 \boxed{x^y} \boxed{2} \boxed{\text{abc}} \boxed{5} \boxed{=} \boxed{}$).

6 Propiedades de los radicales

Los radicales tienen una serie de propiedades que debes conocer y utilizar con soltura. Todas ellas son consecuencias de propiedades de las potencias.

Entrénate

1 Simplifica.

- a) $\sqrt[4]{5^2}$ b) $\sqrt[6]{2^3}$ c) $\sqrt[8]{3^4}$
d) $\sqrt{7^4}$ e) $\sqrt[3]{5^6}$ f) $\sqrt[4]{11^8}$

Entrénate

2 Extrae factores.

- a) $\sqrt{12}$ b) $\sqrt{50}$
c) $\sqrt[3]{16}$ d) $\sqrt[3]{24}$
e) $\sqrt{175}$ f) $\sqrt[4]{80}$
g) $\sqrt{180}$ h) $\sqrt{300}$

Entrénate

3 Multiplica y simplifica.

- a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$
c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{15}$ d) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$
e) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{6}$ f) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

Entrénate

4 Efectúa.

- a) $(\sqrt[3]{2})^3$ b) $(\sqrt[5]{3})^{10}$ c) $(\sqrt{7})^3$
d) $(\sqrt[6]{2^3})^2$ e) $(\sqrt[3]{5^2})^2$ f) $(\sqrt[4]{2^2})^3$

Simplificación de radicales

Si el radicando está en forma de potencia, o puede ponerse así, es posible que el radical pueda simplificarse. Para ello, conviene expresarlo en forma de potencia.

Por ejemplo:

$$\sqrt[4]{3^2} = 3^{2/4} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$$

$$\sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

$$\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$$

Extracción de factores fuera de una raíz

Si el radicando descompuesto en factores tiene potencias de exponente igual o mayor que el índice de la raíz, algunos de ellos pueden salir fuera de la raíz.

Por ejemplo:

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{720} &= \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = 2^{4/2} \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = \\ &= 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 12\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{3}$$

Producto de radicales del mismo índice

Por ejemplo:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3 \cdot 2} = \sqrt{6}$$

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{15 \cdot 20} = \sqrt{300} = \sqrt{100 \cdot 3} = \sqrt{100} \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{50} = \sqrt[3]{5 \cdot 50} = \sqrt[3]{5^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

Potencia de un radical

Por ejemplo:

$$(\sqrt{2^3})^4 = \sqrt{2^3 \cdot 4} = \sqrt{2^{12}} = 2^{12/2} = 2^6$$

$$(\sqrt[5]{4})^3 = (\sqrt[5]{2^2})^3 = \sqrt[5]{2^2 \cdot 3} = \sqrt[5]{2^6} = 2\sqrt[5]{2}$$

$$(\sqrt[6]{7^2})^3 = \sqrt[6]{7^2 \cdot 3} = \sqrt[6]{7^6} = 7$$

Entrenate**1** Escribe con solo una raíz.

a) $\sqrt{\sqrt{5}}$ b) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{7}}$ c) $\sqrt[3]{\sqrt{10}}$

Entrenate**2** Suma si es posible.

a) $\sqrt{2} + 7\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{7} + \sqrt{7}$
c) $2\sqrt{3} - \sqrt{3}$ d) $\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$

Entrenate**3** Elimina el radical del denominador.

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Raíz de un radical

Por ejemplo:

$$\sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[4]{5}$$
$$\sqrt[3]{\sqrt[3]{11}} = \sqrt[6]{11}$$

Suma y resta de radicales

Dos radicales distintos no pueden sumarse si no es obteniendo sus expresiones decimales aproximadas. Solo pueden sumarse radicales idénticos. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{3} + \sqrt{2} \\ \sqrt{7} - \sqrt[3]{7} \end{array} \right\} \text{ Solo pueden realizarse de forma aproximada, o bien hay que dejarlas indicadas.}$$

Sí puede simplificarse la expresión siguiente:

$$7\sqrt{5} + 11\sqrt{5} - \sqrt{5} = 17\sqrt{5}$$

Hay casos en los que la posibilidad de simplificar una suma de radicales queda oculta. Previamente, deberemos sacar los factores que podamos fuera de las raíces, o simplificarlas. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{50} &= \sqrt{2^5} + \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{5^2 \cdot 2} = \\ &= 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Eliminación de un radical del denominador

Es costumbre en los resultados matemáticos en los que intervienen radicales evitar que estos estén en el denominador. Veamos unos casos en los que esto se consigue de forma sencilla:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{7}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^3}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{7}$$

Observa que se multiplica el denominador por el radical necesario para que desaparezca la raíz:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \quad ; \quad \sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2} = 7$$

Lógicamente, el numerador se multiplica por la misma expresión.

Actividades**1** Simplifica.

a) $\sqrt[12]{x^9}$ b) $\sqrt[12]{x^8}$ c) $\sqrt[5]{y^{10}}$
d) $\sqrt[6]{8}$ e) $\sqrt[9]{64}$ f) $\sqrt[8]{81}$

2 Sacar del radical los factores que sea posible.

a) $\sqrt{x^3}$ b) $\sqrt[3]{a^5}$ c) $\sqrt{b^5}$
d) $\sqrt[3]{32x^4}$ e) $\sqrt[3]{81a^3b^5c}$ f) $\sqrt[5]{64}$

3 Multiplica y simplifica.

a) $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{a^2} \sqrt[3]{a^4}$
c) $\sqrt[6]{x} \sqrt[6]{x^2}$ d) $\sqrt[4]{\frac{3}{5}} \sqrt[4]{\frac{5}{3}}$

4 Extrae factores y suma si es posible.

a) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ b) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$
c) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$ d) $2\sqrt{6} - \sqrt{8}$

Observa

- a) 34 m tiene 2 cifras significativas.
 b) 0,0863 hm³ tiene 3 cifras significativas.
 c) 53 000 g tiene 2 cifras significativas, pues los ceros del final solo sirven para designar el número. Mejor sería que se pusiera 53 miles de gramos, o bien, 53 kg.

Observa

- a) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Medición: } 34 \text{ m} \\ \text{Error absoluto} < 0,5 \text{ m} \end{array} \right.$
 b) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Medición: } 0,0863 \text{ hm}^3 \\ \text{Error abs.} < 0,00005 \text{ hm}^3 \\ \text{Es decir, error abs.} < 50 \text{ m}^3 \end{array} \right.$
 c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Medición: } 53\,000 \text{ g} \\ \text{Error absoluto} < 500 \text{ g} \end{array} \right.$

Observa

Los errores relativos de las mediciones anteriores son:

- a) E.r. $< 0,5/34 < 0,015$
 b) E.r. $< 0,00005/0,0863 < 0,0006$
 c) E.r. $< 500/53\,000 < 0,0095 < 0,01$

Cálculo mental

Expresa en notación científica los siguientes números:

- a) 340 000
 b) 0,00000319
 c) $25 \cdot 10^6$
 d) $0,04 \cdot 10^9$
 e) $480 \cdot 10^{-8}$
 f) $0,05 \cdot 10^{-8}$

Aproximaciones y errores

En las aplicaciones prácticas se suelen manejar números aproximados. Recordemos algunos conceptos y procedimientos con los que se controla su uso.

Se llaman **cifras significativas** las que se usan para expresar un número aproximado. Solo se deben utilizar aquellas cuya exactitud nos conste y de modo que sean relevantes para lo que se desea transmitir.

Por ejemplo, si al medir la capacidad de una piscina se obtiene 718 900 l, sería más razonable decir que tiene 719 m³, utilizando solo 3 cifras significativas. Pero si la medición no fue muy fina, lo propio sería decir 720 m³ o, mejor, 72 decenas de m³.

Error absoluto de una medida aproximada es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado.

$$\text{Error absoluto} = |\text{Valor real} - \text{Valor aproximado}|$$

El valor exacto, generalmente, es desconocido. Por tanto, también se desconoce el error absoluto. Lo importante es poder acotarlo: **el error absoluto es menor que...** Una cota del error absoluto se obtiene a partir de la última cifra significativa utilizada.

En el ejemplo anterior (capacidad de la piscina: 719 m³), la última cifra significativa (el 9) designa unidades de m³. El error absoluto *es menor que medio metro cúbico* (error $< 0,5 \text{ m}^3$).

Error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real. Es tanto menor cuantas más cifras significativas se usan.

En el ejemplo, el error relativo es menor que $\frac{0,5}{719} < 0,0007$.

Notación científica

Los números $3,845 \cdot 10^{15}$ y $9,8 \cdot 10^{-11}$ están en notación científica porque:

- Están descritos mediante dos factores, un número decimal y una potencia de 10.
- El número decimal es mayor o igual que 1 y menor que 10.
- La potencia de 10 es de exponente entero.

El primero, $3,845 \cdot 10^{15} = 3\,845\,000\,000\,000\,000$, es un número “grande”.

El segundo, $9,8 \cdot 10^{-11} = 0,000000000098$, es un número “pequeño”.

El exponente sirve para interpretar cómo de grande o de pequeño es el número, pues nos da la cantidad total de cifras que tiene.

Ejercicios resueltos

1. Expresar con un número razonable de cifras significativas las siguientes cantidades:

- a) Visitantes en un año a una pinacoteca: 183 594.
 b) Asistentes a una manifestación: 234 590.
 c) Número de bacterias en 1 dm^3 de cierto preparado: 302 593 847.

1. a) Puede ser razonable que esta cantidad se dé con tanta precisión, pues los asistentes a un museo pagan una entrada que, lógicamente, se contabiliza. Suponemos que ese número, 183 594, es el de entradas vendidas.

No obstante, para cierto tipo de comunicaciones podría simplificarse la cifra: “casi doscientos mil”, “más de ciento ochenta mil” son valoraciones adecuadas.

b) Es imposible que nadie haya contado los manifestantes con tanta precisión. Aunque la cifra no esté “hinchada” o “achicada” por razones sectarias, no se puede afinar tanto en estas valoraciones. Razonable sería decir, por ejemplo, “más de doscientos mil”, o bien “entre 200 000 y 250 000”.

c) Una o, como mucho, dos cifras significativas: 3 cientos de millones de bacterias (o 30 decenas de millones).

2. Dar una cota del error absoluto y una cota del error relativo cometido en cada una de las valoraciones que se han dado en las cantidades del ejercicio anterior.

2. a) Si decimos que el número de visitantes es 180 mil (o mejor, 18 decenas de miles) cometemos un error absoluto de $183\,594 - 180\,000 = 3\,594$ personas. Lo sabemos con precisión porque conocemos la cantidad exacta. Sin embargo, quien reciba la información (18 decenas de miles) deberá entender que puede haber un error de hasta 5 unidades de la primera cifra no utilizada: 5 000 personas. Es decir:

180 mil personas, con un error menor que 5 000

Error relativo $< 5\,000/180\,000 < 0,028 < 0,03 \rightarrow \text{E.r.} < 0,03$

b) Valoración: 200 000 $\rightarrow$ Error absoluto $< 50\,000$

Error relativo $< 50\,000/200\,000 = 0,25$

c) Valoración: 3 cientos de millones = 300 millones

Error absoluto $< 0,5$ decenas de millones = 5 millones

Error relativo $< 5/300 < 0,017 < 0,02 \rightarrow \text{E.r.} < 0,02$

3. Efectuar y repasar con la calculadora:

- a) $(6,4 \cdot 10^5) \cdot (5,2 \cdot 10^{-6})$
 b) $(2,52 \cdot 10^4) : (4 \cdot 10^{-6})$

3. a) $(6,4 \cdot 10^5) \cdot (5,2 \cdot 10^{-6}) = 33,28 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6} = 3,328 \cdot 10 \cdot 10^{-1} = 3,328$

b) $(2,52 \cdot 10^4) : (4 \cdot 10^{-6}) = 0,63 \cdot 10^4 - (-6) = 6,3 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{10} = 6,3 \cdot 10^9$

Actividades

1 Escribe estos números en notación científica:

- a) 13 800 000   b) 0,000005
 c) 4 800 000 000   d) 0,0000173

2 Calcula mentalmente y comprueba con la calculadora.

- a) $(2 \cdot 10^5) \cdot (3 \cdot 10^{12})$ b) $(1,5 \cdot 10^{-7}) \cdot (2 \cdot 10^{-5})$
 c) $(3,4 \cdot 10^{-8}) \cdot (2 \cdot 10^{17})$ d) $(8 \cdot 10^{12}) : (2 \cdot 10^{17})$
 e) $(9 \cdot 10^{-7}) : (3 \cdot 10^7)$ f) $(4,4 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^{-5})$
 g) $(5 \cdot 10^{-7}) \cdot (8 \cdot 10^{-9})$

3 ¿Cuál de las siguientes medidas es más precisa (tiene menos error relativo)? Di, en cada una, de qué orden es el error absoluto cometido:

- a) Altura de Claudia: 1,75 m.
 b) Precio de un televisor: 1 175 €.
 c) Tiempo de un anuncio: 95 segundos.
 d) Oyentes de un programa de radio: 2 millones.

4 Di una cota del error absoluto en cada una de estas medidas: 53 s; 18,3 s; 184 s; 8,43 s. ¿En cuál de ellas es mayor el error relativo?

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Números reales

- 1 $\nabla\nabla\nabla$ a) Clasifica los siguientes números en racionales e irracionales:

$$\frac{41}{13}; \sqrt{49}; 53,\overline{7}; 3,2; \sqrt{12}; \sqrt[3]{5}; \frac{\pi}{2}$$

- b) ¿Alguno de ellos es entero?
c) Ordénalos de menor a mayor.

- 2 $\nabla\nabla\nabla$ Di cuáles de los siguientes números son irracionales:

$$\frac{-3}{4}; 1,\overline{73}; \sqrt{3}; \pi; \sqrt{9}; \frac{1+\sqrt{5}}{2}; 3,7$$

- 3 $\nabla\nabla\nabla$ Indica cuáles de los siguientes números pueden expresarse como cociente de dos números enteros y cuáles no:

$$21,5; \sqrt{7}; 2,010010001\dots; \sqrt[3]{-8}; 2 + \sqrt{3}; 0,\overline{5}; 2\pi - 1$$

- 4 $\nabla\nabla\nabla$ Clasifica estos números en naturales, enteros, racionales y reales:

3	$-\frac{3}{4}$	$\sqrt{2}$	7,23
-2	$\pi + 1$	0	-4
$\frac{1}{3}$	$\sqrt[3]{-1}$	$\frac{11}{9}$	$\sqrt{5}$
2	2,48	18	$1 + \sqrt{2}$
-1	$\sqrt[5]{-2}$	1	1,010203...

Intervalos y semirrectas

- 5 $\nabla\nabla\nabla$ Describe cuáles son los números que pertenecen a los intervalos siguientes:

$$A = (-2, 3) \quad B = [5, 10] \quad C = [0, 7)$$

$$D = (-1, 4] \quad E = (-\infty, 2) \quad F = [3, +\infty)$$

- 6 $\nabla\nabla\nabla$ Considera los números siguientes:

$$1; 2; 2,3; 3; 3,9; 4; 4,1$$

- a) Indica cuáles de ellos pertenecen al intervalo $[2, 4)$.
b) ¿Y cuáles pertenecen al intervalo $[2, 4]$?
c) ¿Y cuáles al $(2, +\infty)$?

- 7 $\nabla\nabla\nabla$ Escribe en forma de intervalo y representa los números que cumplen estas condiciones, en cada caso:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 0 < x < 1 & \text{b) } x \leq -3 & \text{c) } x > 0 \\ \text{d) } -5 \leq x \leq 5 & \text{e) } x > -5 & \text{f) } 1 \leq x < 3 \end{array}$$

- 8 $\nabla\nabla\nabla$ Escribe en forma de desigualdad y representa los siguientes intervalos:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (1; 2,5) & \text{b) } [-2, 3] & \text{c) } [-7, 0) \\ \text{d) } [-3, +\infty) & \text{e) } (2, +\infty) & \text{f) } (-5, 2] \end{array}$$

- 9 $\nabla\nabla\nabla$ Expresa como intervalos y mediante desigualdades cada uno de los conjuntos de números representados:

- 10 $\nabla\nabla\nabla$ Escribe en forma de intervalo y representa los números que cumplen las condiciones dadas en cada caso:

- a) Menores o iguales que 3.
b) Comprendidos entre -1 y 0 , incluyendo el 0 , pero no el -1 .
c) Mayores que 2 , pero menores que 3 .
d) Mayores que 5 .

Potencias y raíces

- 11 $\nabla\nabla\nabla$ Expresa en forma exponencial.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \sqrt[3]{5^2} & \text{b) } \sqrt[5]{a^2} & \text{c) } \sqrt[8]{a^5} & \text{d) } \sqrt[3]{x} \\ \text{e) } \sqrt{a^{-1}} & \text{f) } \sqrt[4]{a^2} & \text{g) } \sqrt{a} & \text{h) } \sqrt{2} \end{array}$$

- 12 $\nabla\nabla\nabla$ Expresa en forma de raíz.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } 3^{2/5} & \text{b) } 2^{3/4} & \text{c) } a^{1/3} & \text{d) } a^{1/2} \\ \text{e) } x^{1/4} & \text{f) } a^{3/2} & \text{g) } x^{-1/2} & \text{h) } x^{-3/2} \end{array}$$

- 13 $\nabla\nabla\nabla$ Calcula.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } 25^{1/2} & \text{b) } 27^{1/3} & \text{c) } 125^{2/3} & \text{d) } 81^{3/4} \\ \text{e) } 9^{5/2} & \text{f) } 16^{5/4} & \text{g) } 49^{3/2} & \text{h) } 8^{5/3} \end{array}$$

- 14 $\nabla\nabla\nabla$ Calcula las siguientes raíces:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \sqrt[4]{16} & \text{b) } \sqrt[5]{243} & \text{c) } \sqrt[7]{0} \\ \text{d) } \sqrt[4]{1} & \text{e) } \sqrt[3]{-1} & \text{f) } \sqrt[5]{-1} \\ \text{g) } \sqrt[3]{-27} & \text{h) } \sqrt{144} & \text{i) } \sqrt[6]{15\,625} \end{array}$$

15 ▼▼▼ Di el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[k]{243} = 3$ b) $\sqrt[3]{k} = -2$ c) $\sqrt[4]{k} = \frac{3}{2}$
 d) $\sqrt[k]{-125} = -5$ e) $\sqrt[3]{k} = -1$ f) $\sqrt[k]{\frac{49}{64}} = \frac{7}{8}$

16 ▼▼▼ Obtén con la calculadora.

a) $\sqrt[5]{9}$ b) $\sqrt[3]{-173}$ c) $\sqrt[4]{14^3}$
 d) $\sqrt[4]{75,3}$ e) $\sqrt[6]{603}$ f) $\sqrt[3]{0,06^2}$

17 ▼▼▼ Halla con la calculadora.

a) $28^{3/4}$ b) $8^{1/2}$ c) $0,02^{2/3}$
 d) $0,8^{3/5}$ e) $12^{5/2}$ f) $3,5^{1/5}$

Radicales

18 ▼▼▼ Simplifica.

a) $\sqrt[6]{9}$ b) $\sqrt{625}$ c) $\sqrt[15]{2^{12}}$
 d) $\sqrt[4]{49}$ e) $\sqrt[6]{125}$ f) $\sqrt[5]{3^{15}}$

19 ▼▼▼ Simplifica los siguientes radicales:

a) $\sqrt[10]{a^8}$ b) $\sqrt[4]{a^{12}}$ c) $\sqrt[12]{a^3}$
 d) $\sqrt[8]{a^2 b^2}$ e) $\sqrt[3]{a^6 b^6}$ f) $\sqrt[6]{a^2 b^4}$

20 ▼▼▼ Multiplica y simplifica el resultado.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}$
 c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{8}$ d) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a^3}$

21 ▼▼▼ Extrae todos los factores que puedas de los siguientes radicales:

a) $\sqrt[3]{16}$ b) $\sqrt{28}$ c) $\sqrt[4]{2^{10}}$
 d) $\sqrt{8}$ e) $\sqrt{200}$ f) $\sqrt{300}$

22 ▼▼▼ Reduce a un solo radical.

a) $\sqrt{\sqrt{13}}$ b) $\sqrt[3]{\sqrt{2}}$ c) $\sqrt[5]{\sqrt[3]{15}}$
 d) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2^5}}$ e) $\sqrt{\sqrt{3^3}}$ f) $\sqrt[5]{\sqrt{11}}$

23 ▼▼▼ Calcula y simplifica en cada caso:

a) $(\sqrt{2})^{10}$ b) $(\sqrt[3]{2})^4$ c) $(\sqrt[4]{3^2})^8$
 d) $\sqrt[4]{\sqrt{8}}$ e) $(\sqrt{\sqrt{2}})^{10}$ f) $(\sqrt[3]{\sqrt{2}})^6$

24 ▼▼▼ Ejercicio resuelto

Expresa como un solo radical:

$$\sqrt{63} - 5\sqrt{28} + \sqrt{112}$$

Descomponemos en factores cada radicando:

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{63} &= \sqrt{3^2 \cdot 7} = 3\sqrt{7} \\ \sqrt{28} &= \sqrt{2^2 \cdot 7} = 2\sqrt{7} \\ \sqrt{112} &= \sqrt{2^4 \cdot 7} = 4\sqrt{7} \end{aligned} \right\} \rightarrow 3\sqrt{7} - 5 \cdot 2\sqrt{7} + 4\sqrt{7} =$$

$$= 3\sqrt{7} - 10\sqrt{7} + 4\sqrt{7} =$$

$$= -3\sqrt{7}$$

25 ▼▼▼ Expresa como un solo radical.

a) $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$ b) $5\sqrt{48} + \sqrt{12}$
 c) $3\sqrt{28} - 5\sqrt{7}$ d) $\sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{24}$

26 ▼▼▼ Efectúa.

a) $2\sqrt{8} + 4\sqrt{72} - 7\sqrt{18}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$
 c) $\sqrt{32} + 3\sqrt{50} - 2\sqrt{8}$ d) $3\sqrt{2} + \sqrt{18} - 3\sqrt{8}$

27 ▼▼▼ Suprime el radical del denominador.

a) $\frac{2}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{4}{\sqrt{6}}$ c) $\frac{6}{\sqrt{12}}$ d) $\frac{3}{\sqrt{15}}$

28 ▼▼▼ Suprime el radical del denominador.

a) $\frac{3}{\sqrt[3]{5}}$ b) $\frac{1}{\sqrt[8]{a^5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ d) $\frac{5}{\sqrt[4]{2}}$

Números aproximados. Notación científica

29 ▼▼▼ Expresa con un número razonable de cifras significativas y da una cota del error absoluto y otra del error relativo de la aproximación que des.

- a) Oyentes de un programa de radio: 843 754
 b) Precio de un coche: 28 782 €
 c) Tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia: 0,0375 segundos.
 d) Gastos de un ayuntamiento: 48 759 450 €

30 ▼▼▼ Escribe en notación científica.

- a) 752 000 000   b) 0,0000512
 c) 0,000007   d) 15 000 000 000

31 ▼▼▼ Expresa en notación científica.

- a) $32 \cdot 10^5$ b) $75 \cdot 10^{-4}$ c) $843 \cdot 10^7$
 d) $458 \cdot 10^{-7}$ e) $0,03 \cdot 10^6$ f) $0,0025 \cdot 10^{-5}$

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

32 ▽▽▽ Calcula mentalmente.

- a) $(1,5 \cdot 10^7) \cdot (2 \cdot 10^5)$ b) $(3 \cdot 10^6) : (2 \cdot 10^{11})$
 c) $(4 \cdot 10^{-7}) : (2 \cdot 10^{-12})$ d) $\sqrt{4 \cdot 10^8}$

33 ▽▽▽ Calcula con lápiz y papel, expresa el resultado en notación científica y compruébalo con la calculadora.

- a) $(3,5 \cdot 10^7) \cdot (4 \cdot 10^8)$ b) $(5 \cdot 10^{-8}) \cdot (2,5 \cdot 10^5)$
 c) $(1,2 \cdot 10^7) : (5 \cdot 10^{-6})$ d) $(6 \cdot 10^{-7})^2$

■ Aplica lo aprendido

34 ▽▽▽ Halla el área total y el volumen de un cilindro de 5 cm de radio y 12 cm de altura. Da su valor exacto en función de π .

35 ▽▽▽ En un círculo cuya circunferencia mide 30π m, cortamos un sector circular de 120° de amplitud. Halla el área de ese sector dando su valor exacto en función de π .

36 ▽▽▽ Calcula el área total y el volumen de un cono de 5 cm de radio y 10 cm de generatriz.

Da el valor exacto.

37 ▽▽▽ Calcula el perímetro de los triángulos ABC , DEF y GHI . Expresa el resultado con radicales.

38 ▽▽▽ Halla el área de un triángulo isósceles en el que los lados iguales miden el doble de la base cuya longitud es $\sqrt{3}$ cm. Expresa el resultado con radicales.

Autoevaluación

¿Sabes clasificar los números en los distintos conjuntos numéricos?

1 Clasifica los siguientes números en naturales, enteros, racionales, irracionales y reales:

$$7,53; \sqrt{64}; \frac{\sqrt{7}}{2}; -5; \frac{\pi}{4}; 3,2\bar{3}; \frac{7}{11}$$

¿Conoces y utilizas las distintas notaciones para un intervalo?

- 2** a) Escribe como intervalo y representa $-3 < x \leq 5$.
 b) Escribe como desigualdad y representa $(-\infty, 8]$.
 c) Escribe en forma de intervalo y representa “los números mayores que -1 ”.
 d) Expresa como una desigualdad el conjunto de números representado:

¿Sabes identificar una raíz con una potencia y manejar las operaciones con radicales?

3 Halla el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[3]{k} = 7$ b) $\sqrt[k]{-125} = -5$ c) $\sqrt{625} = k$

4 Simplifica y, si es posible, extrae factores:

a) $\sqrt[3]{2^{15}}$ b) $\sqrt[8]{6^{10}}$
 c) $\sqrt[3]{60} \cdot \sqrt[3]{18}$ d) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{64}}$

5 Opera:

a) $4\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27} - \sqrt{75}$

6 Suprime el radical del denominador y simplifica.

a) $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{14}{\sqrt[4]{7}}$

2 Polinomios y fracciones algebraicas

El lenguaje algebraico actual es sencillo, cómodo y operativo. En el largo camino para llegar a él, cabe considerar tres grandes etapas.

ÁLGEBRA PRIMITIVA O RETÓRICA. En ella, todo se describe con lenguaje ordinario. Babilonios, egipcios y griegos antiguos la practicaban; y también los árabes, quienes, entrado ya el siglo IX, retornaron a ella.

ÁLGEBRA SINOPADA. **Diofanto** (s. III) fue el pionero, utilizando una serie de abreviaturas que aliviaban los procesos. Por ejemplo, $7x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 6$ lo escribía **SS7 C2 X5 M S4 U6** (S significa cuadrado; C, cubo; X, incógnita; M, menos; U, número).

Durante el Renacimiento (ss. XV y XVI), el álgebra sincopada mejoró debido a la incorporación de nuevos símbolos: operaciones, coeficientes, potencias...

ÁLGEBRA SIMBÓLICA. Consiste en una simbolización completa. **Vieta**, a finales del XVI, mejoró lo que ya había, de modo que su lenguaje algebraico fue predecesor del actual. Y **Descartes**, en el siglo XVII, lo acabó de perfeccionar. Actualmente, escribimos el álgebra tal como lo hacía él, a excepción del signo =, que él lo ponía así: ∞ (parece que este signo proviene de una deformación de æ , iniciales de *aequalis*, igual).

La falta de operatividad del álgebra durante muchos siglos obligó a los matemáticos a agudizar su ingenio para obtener y demostrar relaciones algebraicas. Algunos se valieron, para ello, de figuras geométricas, dando lugar al *álgebra geométrica*.

DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se operan los polinomios (suma, resta y multiplicación).
- Cómo sacar factor común.
- Las identidades notables.

1 Operaciones con polinomios

Suma y resta de polinomios

Para sumar dos polinomios, agrupamos sus términos y simplificamos los monomios semejantes. Para restar dos polinomios, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo.

Por ejemplo: $A = 3x^2 + 5x - 2$, $B = x^3 + 4x^2 - 5$

Definición

Se llama **opuesto** de un polinomio al que resulta de cambiar de signo todos sus términos:

$$\begin{aligned} -(x^3 + 2x^2 - 5x - 11) &= \\ &= -x^3 - 2x^2 + 5x + 11 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{A} \\ + B \\ \hline A + B \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ x^3 + 4x^2 - 5 \\ \hline x^3 + 7x^2 + 5x - 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} \boxed{A} \\ - B \\ \hline A - B \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ -x^3 - 4x^2 + 5 \\ \hline -x^3 - x^2 + 5x + 3 \end{array}$$

A veces, escribimos directamente el resultado, quitando paréntesis (si los hay) y agrupando los monomios semejantes. Por ejemplo:

- $(x^2 + 3x + 2) + (2x^2 - 5) = x^2 + 3x + 2 + 2x^2 - 5 = 3x^2 + 3x - 3$
- $(3x + 1) - (2x - 3) = 3x + 1 - 2x + 3 = x + 4$

Producto de un monomio por un polinomio

Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada término del polinomio.

Por ejemplo: $M = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$, $N = 3x^2$

$$\begin{array}{r} \boxed{M} \\ \times N \\ \hline M \cdot N \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + 5x - 1 \\ 3x^2 \\ \hline 3x^5 - 6x^4 + 15x^3 - 3x^2 \end{array}$$

También, en este caso, podemos escribir directamente el resultado. Por ejemplo:

- $(2x^2 - 3) \cdot (2x) = 4x^3 - 6x$
- $7(2x + 5) = 14x + 35$
- $(5x^2)(6x^2 - 4x + 3) = 30x^4 - 20x^3 + 15x^2$

Actividades

1 Sean $P = x^4 - 3x^3 + 5x + 3$, $Q = 5x^3 + 3x^2 - 11$.
Halla $P + Q$ y $P - Q$.

2 Efectúa.

- a) $2x(3x^2 - 4x)$
- b) $5(x^3 - 3x)$
- c) $4x^2(-2x + 3)$
- d) $-2x(x^2 - x + 1)$
- e) $-6(x^3 - 4x + 2)$
- f) $-x(x^4 - 2x^2 + 3)$

3 Halla los productos siguientes:

- a) $x(2x + y + 1)$
- b) $2a^2(3a^2 + 5a^3)$
- c) $ab(a + b)$
- d) $5(3x^2 + 7x + 11)$
- e) $x^2y(x + y + 1)$
- f) $5xy^2(2x + 3y)$
- g) $6x^2y^2(x^2 - x + 1)$
- h) $-2(5x^3 + 3x^2 - 8)$
- i) $3a^2b^3(a - b + 1)$
- j) $-2x(3x^2 - 5x + 8)$

Producto de dos polinomios

Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada monomio de uno de los factores por todos y cada uno de los monomios del otro factor y, después, se suman los monomios semejantes obtenidos.

Por ejemplo: $P = 2x^3 - 4x^2 - 1$, $Q = 3x - 2$

$$\begin{array}{r}
 2x^3 - 4x^2 \quad - 1 \quad \leftarrow P \\
  \quad 3x - 2 \quad \leftarrow Q \\
 \hline
 -4x^3 + 8x^2 \quad + 2 \quad \leftarrow \text{producto de } -2 \text{ por } P \\
 6x^4 - 12x^3 \quad - 3x \quad \leftarrow \text{producto de } 3x \text{ por } P \\
 \hline
 6x^4 - 16x^3 + 8x^2 - 3x + 2 \quad \leftarrow P \cdot Q
 \end{array}$$

Ten en cuenta

Esta forma de disponer los cálculos permite multiplicar polinomios de manera ordenada y segura. Cuando falta algún término, hay que dejar un hueco en el lugar correspondiente.

A veces, cuando hay pocos términos, realizamos el producto escribiéndolo directamente. Por ejemplo:

$$(2x^2 - 1)(3x + 4) = 6x^3 + 8x^2 - 3x - 4$$

División de polinomios

La división de polinomios es similar a la división entera de números naturales. Veamos cómo se procede en la práctica dividiendo dos polinomios concretos:

$$P(x) = 2x^3 - 7x^2 - 11x + 13 \quad Q(x) = 2x + 3 \quad P(x) : Q(x)$$

$$\begin{array}{r}
 2x^3 - 7x^2 - 11x + 13 \\
 \text{Restamos } x^2(2x + 3) \longrightarrow -2x^3 - 3x^2 \\
 \hline
 -10x^2 - 11x + 13 \\
 \text{Restamos } -5x(2x + 3) \longrightarrow 10x^2 + 15x \\
 \hline
 4x + 13 \\
 \text{Restamos } 2(2x + 3) \longrightarrow -4x - 6 \\
 \hline
 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2x + 3 \\
 \overline{) x^2 - 5x + 2} \\
 \hline
 (2x^3) : (2x) = x^2 \\
 (-10x^2) : (2x) = -5x \\
 (4x) : (2x) = 2
 \end{array}$$

DIVIDENDO = DIVISOR · COCIENTE + RESTO

$$\text{Por tanto: } 2x^3 - 7x^2 - 11x + 13 = (2x + 3) \cdot (x^2 - 5x + 2) + 7$$

Actividades

4 Dados los polinomios $P = 3x^2 - 5$, $Q = x^2 - 3x + 2$, $R = -2x + 5$, calcula:

- a) $P \cdot R$ b) $Q \cdot R$ c) $P \cdot Q$

5 Opera y simplifica:

- a) $2x(3x^2 - 2) + 5(3x - 4)$
 b) $(x^2 - 3)(x + 1) - x(2x^2 + 5x)$
 c) $(3x - 2)(2x + 1) - 2(x^2 + 4x)$

6 Efectúa $P(x) : Q(x)$ en cada caso y expresa el resultado así:

$$P(x) = Q(x) \cdot \text{COCIENTE} + \text{RESTO}$$

- a) $P(x) = 3x^2 - 11x + 5$ $Q(x) = x + 6$
 b) $P(x) = 6x^3 + 2x^2 + 18x + 3$ $Q(x) = 3x + 1$
 c) $P(x) = 6x^3 + 2x^2 + 18x + 3$ $Q(x) = x$
 d) $P(x) = 5x^2 + 11x - 4$ $Q(x) = 5x - 2$

División de un polinomio por $x - a$. Regla de Ruffini

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini fue un matemático italiano que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Se le dio su nombre a esta regla porque la utilizó en la demostración de una importante propiedad matemática. Pero dicha regla ya aparecía en un libro de álgebra de Pietro Paoli publicado 25 años antes.

Es muy frecuente tener que dividir un polinomio por una expresión del tipo $x - a$. El procedimiento que exponemos a continuación permite realizar esas divisiones de forma rápida y cómoda. Veámoslo por medio de un ejemplo:

$$\begin{array}{r}
 7x^4 - 11x^3 \quad - 94x + 7 \quad | \quad x - 3 \\
 \underline{- 7x^4 + 21x^3} \\
 10x^3 \\
 \underline{- 10x^3 + 30x^2} \\
 30x^2 \\
 \underline{- 30x^2 + 90x} \\
 - 4x \\
 \underline{+ 4x - 12} \\
 - 5
 \end{array}$$

Esta misma división puede realizarse, sintéticamente, del siguiente modo:

3	7	-11	0	-94	7	
	7	10	30	-4	-5	
	COEFICIENTES DEL COCIENTE					RESTO

COCIENTE: 7 10 30 -4   significa: $7x^3 + 10x^2 + 30x - 4$
 RESTO: -5

Los pasos, numerados en verde, son los mismos que se hacen en la división realizada arriba.

Este método, en el que solo intervienen los coeficientes y solo se realizan las operaciones que realmente importan, se llama regla de Ruffini.

La **regla de Ruffini** sirve para dividir un polinomio por $x - a$. Las operaciones (sumas y multiplicaciones por a) se realizan una a una. Se obtienen, así, los coeficientes del cociente y el resto de la división.

Actividades

7 Aplica la regla de Ruffini para efectuar las siguientes divisiones:

- $(5x^4 + 6x^2 - 11x + 13) : (x - 2)$
- $(6x^5 - 3x^4 + 2x) : (x + 1)$
- $(7x^2 - 5x^3 + 3x^4 - 2x + 13) : (x - 4)$
- $(4x^3 - 9 - 51x^2 + 6x^4 - 3x) : (x + 3)$

8 Aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las siguientes divisiones de polinomios:

- $(x^2 + 3x + 2) : (x + 2)$
- $(2x^3 + 3x + 1) : (x - 1)$
- $(x^4 - 3x^3 + 2x + 8) : (x - 2)$
- $(x^5 - 4x^3 + 3x^2) : (x - 1)$

Cálculo mental

Di si 0, 1, -1, 2 o -2 son raíces de los siguientes polinomios:

- $x^3 - 4x$
- $x^4 - x^3 - 2x^2$
- $x^3 + x^2 - 25x - 25$
- $x^5 - 5x^3 + 4x$

Igualdades notables

Las **igualdades notables**, así como la extracción de **factor común**, son procedimientos sencillos que ayudan en la factorización de polinomios.

Raíces de un polinomio

Un número a se llama **raíz** de un polinomio $P(x)$ si $P(a) = 0$. Las raíces de un polinomio son las soluciones de la ecuación $P(x) = 0$.

Para localizar las raíces enteras de un polinomio, probaremos con los divisores (positivos y negativos) de su término independiente.

Una vez localizada una raíz, a , puesto que $P(x)$ es divisible por $x - a$, podremos ponerlo así: $P(x) = (x - a) \cdot P_1(x)$. Las restantes raíces las buscaremos en $P_1(x)$.

Procedimiento para factorizar un polinomio

Factorizar un polinomio es descomponerlo en producto de polinomios (factores) del menor grado posible.

Veamos, prácticamente, cómo factorizar $P(x) = 4x^4 - 4x^3 - 9x^2 + x + 2$:

- Para localizar las raíces de $P(x)$, iremos probando con los divisores (positivos y negativos) de 2. Empecemos por 1 y por -1:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 4 & -4 & -9 & 1 & 2 \\ & & 4 & 0 & -9 & -8 \\ \hline & 4 & 0 & -9 & -8 & \underline{-6} \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrrr} -1 & 4 & -4 & -9 & 1 & 2 \\ & & -4 & 8 & 1 & -2 \\ \hline & 4 & -8 & -1 & 2 & \underline{0} \end{array}$$

1 no es raíz.

-1 sí es raíz.

Escribimos $P(x)$ factorizado: $P(x) = (x + 1)(4x^3 - 8x^2 - x + 2)$

- Ahora buscamos las raíces de $P_1(x) = 4x^3 - 8x^2 - x + 2$:

1 ha quedado descartado. Probamos de nuevo con -1 y resulta que no lo es (es decir, -1 es una *raíz simple*). A continuación, probamos con 2:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 4 & -8 & -1 & 2 \\ & & 8 & 0 & -2 \\ \hline & 4 & 0 & -1 & \underline{0} \end{array} \qquad \begin{array}{l} 2 \text{ sí es raíz de } P_1(x) \text{ [y, por tanto, de } P(x)] \\ P_1(x) = (x - 2)(4x^2 - 1) \end{array}$$

- Cuando queda un polinomio cuyas raíces se pueden localizar por otros medios, al hacerlo se concluye el proceso. En nuestro caso, reconocemos que $4x^2 - 1 = (2x + 1)(2x - 1)$. Por tanto, el resultado final es:

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(2x + 1)(2x - 1) = 4(x + 1)(x - 2)(x + 1/2)(x - 1/2)$$

Hay polinomios para cuya factorización no es necesario aplicar la regla de Ruffini. Por ejemplo, $Q(x) = x^4 - x^3 - 20x^2$.

- Empezamos por extraer x^2 como factor común: $Q(x) = x^2(x^2 - x - 20)$
- Ahora hallamos las raíces de $x^2 - x - 20$: $x_1 = 5$ y $x_2 = -4$.
Por tanto, $Q(x) = x^2(x - 5)(x + 4)$.

Notas

- Si llegamos a un polinomio de segundo grado sin raíces, dicho polinomio queda como un único factor (no se puede descomponer en dos).
- Si un polinomio tiene más de dos raíces no enteras, entonces, aunque pueda factorizarse, nosotros no sabremos hacerlo.

Ejercicios resueltos

- 1. Factorizar y decir cuáles son las raíces.**

$$P(x) = 12x^5 - 36x^4 + 27x^3$$

- 1.** Todos los sumandos tienen el factor x^3 . Los coeficientes 12, -36 y 27 son múltiplos de 3. Por tanto, podemos sacar $3x^3$ como factor común.

$$P(x) = 3x^3(4x^2 - 12x + 9)$$

Observamos que $4x^2 - 12x + 9$ es igual a $(2x - 3)^2$.

$$P(x) = 3x^3(2x - 3)^2$$

Obtenemos las raíces igualando a 0 cada factor.

Las raíces de $P(x)$ son 0 (raíz triple) y $3/2$ (raíz doble).

- 2. Factorizar.**

$$Q(x) = 4x^2 - 8x + 3$$

- 2.** Buscamos las raíces igualando a 0 y resolviendo la ecuación:

$$4x^2 - 8x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}; x = \frac{3}{2}$$

Por tanto: $Q(x) = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right)$, o bien:

$$Q(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)2\left(x - \frac{3}{2}\right) = (2x - 1)(2x - 3)$$

- 3. Factorizar.**

$$R(x) = x^3 - x + 6$$

- 3.** Utilizamos la regla de Ruffini para localizar una raíz entre los divisores de 6:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 0 & -1 & 6 \\ -2 & & -2 & 4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & 3 & 0 \end{array}$$

-2 es una raíz de $R(x)$.

Buscamos raíces de $x^2 - 2x + 3$:

$x^2 - 2x + 3 = 0$ no tiene solución.

Hemos llegado a un polinomio de segundo grado que no tiene raíces.

Entonces: $R(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 3)$

Actividades

- 1** Factoriza los siguientes polinomios:

a) $3x^2 + 2x - 8$

b) $3x^3 - 48x$

c) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

d) $x^3 - 7x^2 + 8x + 16$

e) $x^3 - 2x^2 - 15x$

f) $2x^3 - x^2 - x + 2$

- 2** Expresa los polinomios siguientes como cuadrado de un binomio (hazlo en tu cuaderno):

a) $x^2 + 12x + 36 = (x + \square)^2$ b) $49 + 14x + x^2$

c) $4x^2 - 20x + 25 = (\square - 5)^2$ d) $1 + 4x + 4x^2$

- 3** Expresa en cada caso como producto de dos binomios (hazlo en tu cuaderno):

a) $x^2 - 16 = (x + \square)(x - \square)$ b) $x^2 - 1$

c) $9 - x^2$ d) $4x^2 - 1$

- 4** Sacar factor común y utilizar las identidades notables para factorizar los siguientes polinomios:

a) $x^3 - 6x^2 + 9x$

b) $x^3 - x$

c) $4x^4 - 81x^2$

d) $x^3 + 2x^2 + x$

e) $3x^3 - 27x$

f) $3x^2 + 30x + 75$

- 5** Factoriza los polinomios siguientes:

a) $x^4 - 8x^3 + 16x^2$

b) $x^3 - 4x$

c) $9x^3 + 6x^2 + x$

d) $4x^2 - 25$

Se llama **fracción algebraica** al cociente indicado de dos polinomios.

Por ejemplo: $\frac{x}{3x^2 - 5}$, $\frac{1}{x + 1}$, $\frac{3x + 1}{x^2 + 6x - 3}$

Las fracciones algebraicas se comportan de forma muy similar a las fracciones numéricas, como veremos a continuación.

Simplificación

Para simplificar una fracción, se dividen el numerador y el denominador por uno o más factores comunes a ambos. Se obtiene así otra fracción equivalente.

Por ejemplo: $\frac{3x(x+1)^2}{6x^2(x+1)} = \frac{\cancel{3}x\cancel{(x+1)}(x+1)}{\cancel{3} \cdot 2 \cdot \cancel{x} \cdot x \cdot \cancel{(x+1)}} = \frac{x+1}{2x}$

Reducción a común denominador

Para reducir varias fracciones a común denominador, se sustituye cada fracción por otra equivalente, de modo que todas tengan el mismo denominador. Este será múltiplo de todos los denominadores.

$$\begin{array}{ccc} \frac{3}{x}, & \frac{5}{x-2} & \text{Denominador común: } x \cdot (x-2) \\ \downarrow & \downarrow & \\ \frac{3 \cdot (x-2)}{x \cdot (x-2)}, & \frac{5 \cdot x}{(x-2) \cdot x} & \end{array}$$

Observa que en cada fracción se han multiplicado numerador y denominador por el factor apropiado para obtener el denominador común que se desea.

Atención

Para sumar (o restar) fracciones algebraicas con el mismo denominador, se suman los numeradores y se mantiene el denominador común.

$$\begin{aligned} \frac{3}{x+1} + \frac{x}{x+1} - \frac{x-2}{x+1} &= \\ = \frac{3+x-(x-2)}{x+1} &= \frac{5}{x+1} \end{aligned}$$

Suma y resta

Para sumar o restar fracciones algebraicas, se reducen a común denominador y se suman o se restan los numeradores, dejando el mismo denominador común.

Por ejemplo: $\frac{3}{x} + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2)}{x(x-2)} + \frac{5x}{x(x-2)} = \frac{3x-6+5x}{x(x-2)} = \frac{8x-6}{x^2-2x}$

Ejercicios resueltos

1. $\frac{3x+5}{2x+3} - \frac{x-7}{2x+3}$

2. $\frac{5x+4}{x} + \frac{x-2}{2x}$

3. $\frac{3}{x^2} + \frac{x+3}{x}$

4. $\frac{3x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$

1. $\frac{3x+5}{2x+3} - \frac{x-7}{2x+3} = \frac{3x+5-(x-7)}{2x+3} = \frac{2x+12}{2x+3}$

2. $\frac{5x+4}{x} + \frac{x-2}{2x} = \frac{2(5x+4)}{2x} + \frac{x-2}{2x} = \frac{10x+8+x-2}{2x} = \frac{11x+6}{2x}$

3. $\frac{3}{x^2} + \frac{x+3}{x} = \frac{3}{x^2} + \frac{x(x+3)}{x \cdot x} = \frac{3+x^2+3x}{x^2} = \frac{x^2+3x+3}{x^2}$

4. $\frac{3x}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{(x+1) \cdot 3x}{(x+1)(x-1)} - \frac{(x-1) \cdot 2}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x^2+3x-(2x-2)}{(x+1)(x-1)} =$
 $= \frac{3x^2+x+2}{x^2-1}$

Producto

El producto de dos fracciones algebraicas es el producto de sus numeradores partido por el producto de sus denominadores.

$$\text{Por ejemplo: } \frac{2x}{x-3} \cdot \frac{5x+1}{x^2} = \frac{2x \cdot (5x+1)}{(x-3) \cdot x^2} = \frac{10x^2 + 2x}{x^3 - 3x^2}$$

Definición

Se llama **inversa** de una fracción algebraica a la que se obtiene intercambiando numerador y denominador:

$$\text{La inversa de } \frac{5}{x+2} \text{ es } \frac{x+2}{5}.$$

Cociente

El cociente de dos fracciones algebraicas es el producto de la primera por la inversa de la segunda (producto cruzado de términos).

$$\text{Por ejemplo: } \frac{3}{x} : \frac{5}{x+2} = \frac{3}{x} \cdot \frac{x+2}{5} = \frac{3(x+2)}{5x} = \frac{3x+6}{5x}$$

Ejercicios resueltos

$$1. \frac{2x-7}{x} \cdot \frac{3}{x+1}$$

$$1. \frac{2x-7}{x} \cdot \frac{3}{x+1} = \frac{3(2x-7)}{x(x+1)} = \frac{6x-21}{x^2+x}$$

$$2. \frac{5}{x-3} : \frac{x}{x^2+1}$$

$$2. \frac{5}{x-3} : \frac{x}{x^2+1} = \frac{5}{x-3} \cdot \frac{x^2+1}{x} = \frac{5(x^2+1)}{(x-3)x} = \frac{5x^2+5}{x^2-3x}$$

$$3. \frac{3}{x} \cdot \left(\frac{5x+3}{x-1} : \frac{5x+3}{x} \right)$$

$$3. \frac{3}{x} \cdot \left(\frac{5x+3}{x-1} : \frac{5x+3}{x} \right) = \frac{3}{x} \cdot \frac{\cancel{5x+3}}{x-1} \cdot \frac{x}{\cancel{5x+3}} = \frac{3}{x-1}$$

Actividades

1 Simplifica las fracciones siguientes. Para ello, saca factor común cuando convenga:

$$a) \frac{15x^2}{5x^2(x-3)}$$

$$b) \frac{3(x-1)^2}{9(x-1)}$$

$$c) \frac{3x^2 - 9x^3}{15x^3 - 3x^4}$$

$$d) \frac{9(x+1) - 3(x+1)}{2(x+1)}$$

$$e) \frac{5x^2(x-3)^2(x+3)}{15x(x-3)}$$

$$f) \frac{x(3x^3 - x^2)}{(3x-1)x^3}$$

2 Opera y simplifica.

$$a) \frac{2}{x} + \frac{3}{2x} + \frac{x-2}{x}$$

$$b) \frac{3}{x+1} - \frac{2x^2+8x}{x^2+x} - 4x$$

$$c) \frac{2}{x^2-9} - \frac{7x}{x-3} + 3$$

$$d) \frac{5x^3+15x^2}{x+3} - \frac{10x^3+15x^2}{5x^2} + 2x$$

3 Efectúa las siguientes operaciones y simplifica. Ten en cuenta las identidades notables:

$$a) \frac{x^2-1}{x} : (x-1)$$

$$b) \frac{x(x-2)}{x} : \frac{x^2-4}{x+2}$$

$$c) \frac{x^2-2x+1}{x} : \frac{x-1}{x}$$

$$d) 6x^2 \cdot \frac{x-3}{x^3}$$

$$e) \frac{3x-3}{x^2} \cdot \frac{x(x+1)}{x^2-1}$$

$$f) \frac{2x}{x-1} : \frac{4x^2}{2x-2}$$

$$g) \frac{x+5}{10} \cdot \frac{5}{(x+5)^2}$$

$$h) \frac{2x^2}{3x} \cdot \frac{6x}{4x^3}$$

$$i) \frac{4x-3}{2x} \cdot \frac{4x^2}{8x-6}$$

$$j) \frac{3x-3}{x^2} \cdot \frac{3x}{18(x-1)}$$

4 Opera y simplifica.

$$a) \frac{6x^2}{4x^2-9} : \left(\frac{5x}{2x-3} + \frac{5x}{2x+3} \right)$$

$$b) \frac{x^2}{5x^2-25} - \frac{1}{5} - \frac{x^3+x^2}{(x+1)(5x^2-25)}$$

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Operaciones con polinomios

1 $\nabla\nabla\nabla$ Opera y simplifica las siguientes expresiones:

a) $3x(2x - 1) - (x - 3)(x + 3) + (x - 2)^2$

b) $(2x - 1)^2 + (x - 1)(3 - x) - 3(x + 5)^2$

c) $\frac{4}{3}(x - 3)^2 - \frac{1}{3}(3x - 1)(3x + 1) - \frac{1}{3}(4x^3 + 35)$

2 $\nabla\nabla\nabla$ Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado:

a) $(2y + x)(2y - x) + (x + y)^2 - x(y + 3)$

b) $3x(x + y) - (x - y)^2 + (3x + y)y$

c) $(2y + x + 1)(x - 2y) - (x + 2y)(x - 2y)$

3 $\nabla\nabla\nabla$ Halla el cociente y el resto de cada una de estas divisiones:

a) $(7x^2 - 5x + 3) : (x^2 - 2x + 1)$

b) $(2x^3 - 7x^2 + 5x - 3) : (x^2 - 2x)$

c) $(x^3 - 5x^2 + 2x + 4) : (x^2 - x + 1)$

4 $\nabla\nabla\nabla$ Calcula el cociente y el resto de las divisiones siguientes:

a) $(3x^5 - 2x^3 + 4x - 1) : (x^3 - 2x + 1)$

b) $(x^4 - 5x^3 + 3x - 2) : (x^2 + 1)$

c) $(4x^5 + 3x^3 - 2x) : (x^2 - x + 1)$

Factor común e identidades notables

5 $\nabla\nabla\nabla$ Expresa como cuadrado de un binomio.

a) $16x^2 + 1 - 8x$ b) $36x^2 + 25y^2 + 60xy$

c) $9x^4 + y^2 + 6x^2y$ d) $y^4 - 2y^2 + 1$

6 $\nabla\nabla\nabla$ Expresa como producto de dos binomios.

a) $49x^2 - 16$ b) $9x^4 - y^2$ c) $81x^4 - 64x^2$

d) $25x^2 - 3$ e) $2x^2 - 100$ f) $5x^2 - 2$

7 $\nabla\nabla\nabla$ Saca factor común e identifica los productos notables como en el ejemplo.

• $2x^4 + 12x^3 + 18x^2 = 2x^2(x^2 + 6x + 9) = 2x^2(x + 3)^2$

a) $20x^3 - 60x^2 + 45x$ b) $27x^3 - 3xy^2$

c) $3x^3 + 6x^2y + 3y^2x$ d) $4x^4 - 81x^2y^2$

Regla de Ruffini. Aplicaciones

8 $\nabla\nabla\nabla$ Aplica la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(5x^3 - 3x^2 + x - 2) : (x - 2)$

b) $(x^4 - 5x^3 + 7x + 3) : (x + 1)$

c) $(-x^3 + 4x) : (x - 3)$

d) $(x^4 - 3x^3 + 5) : (x + 2)$

9 $\nabla\nabla\nabla$ Comprueba si los polinomios siguientes son divisibles por $x - 3$ o $x + 1$.

a) $P_1(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$

b) $P_2(x) = x^3 + 4x^2 - 11x - 30$

c) $P_3(x) = x^4 - 7x^3 + 5x^2 - 13$

$\Rightarrow$ Recuerda, para que sea divisible, el resto debe ser 0.

Factorización de polinomios

10 $\nabla\nabla\nabla$ Factoriza los siguientes polinomios:

a) $x^2 + 4x - 5$

b) $x^2 + 8x + 15$

c) $7x^2 - 21x - 280$

d) $3x^2 + 9x - 210$

11 $\nabla\nabla\nabla$ Busca, en cada caso, una raíz entera y factoriza, después, el polinomio:

a) $2x^2 - 9x - 5$

b) $3x^2 - 2x - 5$

c) $4x^2 + 17x + 15$

d) $-x^2 + 17x - 72$

12 $\nabla\nabla\nabla$ Saca factor común y utiliza las identidades notables para factorizar los siguientes polinomios:

a) $3x^3 - 12x$

b) $4x^3 - 24x^2 + 36x$

c) $45x^2 - 5x^4$

d) $x^4 + x^2 + 2x^3$

e) $x^6 - 16x^2$

f) $16x^4 - 9$

13 $\nabla\nabla\nabla$ Descompón en factores y di cuáles son las raíces de los siguientes polinomios:

a) $x^3 + 2x^2 - x - 2$

b) $3x^3 - 15x^2 + 12x$

c) $x^3 - 9x^2 + 15x - 7$

d) $x^4 - 13x^2 + 36$

14 $\nabla\nabla\nabla$ Factoriza los siguientes polinomios y di cuáles son sus raíces:

a) $x^3 - 2x^2 - 2x - 3$

b) $2x^3 - 7x^2 - 19x + 60$

c) $x^3 - x - 6$

d) $4x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 4x - 1$

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Fracciones algebraicas

15 Simplifica estas fracciones algebraicas:

a) $\frac{9x}{12x^2}$ b) $\frac{x(x+1)}{5(x+1)}$ c) $\frac{x^2(x+2)}{2x^3}$

16 Simplifica las siguientes fracciones algebraicas. Para ello, saca factor común:

a) $\frac{x^2 - 4x}{x^2}$ b) $\frac{3x}{x^2 + 2x}$ c) $\frac{3x + 3}{(x + 1)^2}$
d) $\frac{2x^2 + 4x}{x^3 + 2x^2}$ e) $\frac{8x^3 - 4x^2}{(2x - 1)^2}$ f) $\frac{5x^3 + 5x}{x^4 + x^2}$

17 Efectúa.

a) $\frac{1}{6x} + \frac{1}{3x^2} - \frac{1}{2x^3}$ b) $\frac{2}{x} + \frac{x-1}{x-7}$
c) $\frac{2}{x} - \frac{3}{x-4} + \frac{x+1}{x-4}$ d) $\frac{2x}{x-3} - \frac{x-1}{x+3}$
e) $\frac{3}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{x}{4}$ f) $\frac{3}{x} - \frac{1}{x^2 + x} + 2$

18 Simplifica. Para ello, transforma en producto el numerador y el denominador.

a) $\frac{2x + 4}{3x^2 + 6x}$ b) $\frac{x + 1}{x^2 - 1}$ c) $\frac{x - 2}{x^2 + 4 - 4x}$
d) $\frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$ e) $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$ f) $\frac{x^3 + 2x^2 + x}{3x + 3}$

19 Opera, y simplifica si es posible.

a) $\frac{x}{x+1} \cdot \frac{3}{x^2}$ b) $\frac{3x+2}{x-1} : \frac{x+1}{x}$
c) $\frac{3}{(x-1)^2} : \frac{2}{x-1}$ d) $(x+1) : \frac{x^2-1}{2}$

Traducción al lenguaje algebraico

20 Expresa mediante un polinomio cada uno de estos enunciados:

- La suma de los cuadrados de dos números consecutivos.
- El área total de un ortoedro de dimensiones x , $2x$ y 5 cm.
- La cantidad de leche envasada en “ x ” botellas de $1,5$ l y en “ y ” botellas de 1 l.

d) El área de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide 3 cm más que el otro.

21 Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión obtenida:

- La edad de Alberto dentro de 22 años.
- La cantidad que se obtiene al invertir x euros y ganar el 11% .
- Por un ordenador y un equipo de música se pagan $2\,500$ €. Si el ordenador cuesta x euros, ¿cuánto cuesta el equipo de música?
- Comprar un artículo por x euros y perder el 15% de su valor. ¿Cuánto costaría ahora?
- El perímetro de un triángulo rectángulo en el cual uno de los catetos mide los $\frac{3}{5}$ de la hipotenusa, y el otro cateto, 5 cm menos que esta.
- Los lados de un triángulo rectángulo isósceles de 24 cm de perímetro.

22 Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión obtenida:

- El área de una lámina de bronce cuya base mide $\frac{5}{3}$ de su altura.
- El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden $16 - x$ y $9 - x$.
- El área de un cuadrado de lado $x + 3$.
- La diferencia de áreas de dos cuadrados de lados x y $x + 3$, respectivamente.
- La superficie de un jardín rectangular de base x y perímetro 70 m.
- El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles de 24 cm de perímetro.
- El área de un rombo sabiendo que la longitud de una diagonal es el triple de la otra.

23 Expresa algebraicamente cada enunciado.

- El cuadrado de la diferencia de dos números.
- La suma de los cuadrados de dos números.
- La diagonal de un rectángulo de dimensiones x e y .
- El coste de la mezcla de dos tipos de café, cuyos precios son 8 €/kg y 10 €/kg.

24 ▽ ▽ ▽ Expresa algebraicamente el área de esta corona circular.

■ Aplica lo aprendido

25 ▽ ▽ ▽ Escribe, en cada caso, un polinomio de segundo grado que tenga por raíces:

- a) 7 y -7
- b) 0 y 5
- c) -2 y -3
- d) 4 (doble)

26 ▽ ▽ ▽ Escribe, en cada caso, un polinomio que tenga las siguientes raíces:

- a) $x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = 2$
- b) $x_1 = 0; x_2 = 2; x_3 = -1$

27 ▽ ▽ ▽ Expresa mediante polinomios el área y el volumen de este ortoedro:

28 ▽ ▽ ▽ En un rectángulo de lados x e y inscribimos un rombo. Escribe el perímetro del rombo en función de los lados del rectángulo.

29 ▽ ▽ ▽ Expresa algebraicamente el área de la parte coloreada utilizando x e y .

Autoevaluación

¿Sabes operar con polinomios?

1 Opera y simplifica:

- a) $(2x + 3) \cdot (x^2 - 3x) - x(x + 8)$
- b) $(x^3 - 2x + 3)(x^2 + 4x - 1)$

2 Halla el cociente y el resto:

- a) $(2x^3 + 3x^2 - 7) : (x + 1)$
- b) $(2x^3 - 11x^2 + 5x) : (2x - 1)$

¿Factorizas un polinomio con agilidad?

3 Completa en tu cuaderno estas expresiones:

- a) $(x + 5)^2 = x^2 + \square + 25$
- b) $(2x - \square)^2 = 4x^2 - 12x + 9$
- c) $(7x + \square)^2 = \square x^2 + \square x + 16$

4 Factoriza:

- a) $x^4 - 16x^2$
- b) $x^3 - 25x$
- c) $x^3 - 6x^2 + 9x$
- d) $x^3 - 2x^5 - 5x + 6$

¿Manejas los procedimientos para simplificar distintas expresiones algebraicas?

5 Reduce:

- a) $6 \cdot \left(\frac{x^2 + 1}{3} - \frac{x^2 - 4}{6} - x + 1 \right)$
- b) $\frac{3 - x}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{x + 5}{2x}$

6 Sustituye x por $1 + 2y$ en $x^2 - y - 8$ y simplifica.

¿Sabes traducir un enunciado al lenguaje algebraico?

7 Expresa algebraicamente y simplifica.

- a) La diferencia de los cuadrados de dos números que suman 7 unidades.
- b) Precio final de un producto que costaba x euros después de una subida del 8%.
- c) La hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide la mitad del otro.
- d) Lo que pago por tres bocadillos y cinco refrescos.

3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

Diofanto (siglo III) propuso problemas algebraicos complejos y los resolvió por métodos originales y muy interesantes. Pero su aportación careció de método y tuvo poco valor pedagógico.

Al-Jwarizmi (siglo IX) fue quien, por primera vez, realizó un tratamiento sistemático y completo de la resolución de ecuaciones de primero y segundo grados. Su libro *Al-jabr wa-l-muqabala*, elemental, didáctico y exhaustivo, fue muy conocido y estudiado y, posteriormente, traducido a todos los idiomas.

En el siglo XVI, varios algebristas italianos (Tartaglia, Cardano, Ferrari, Fior) mantuvieron unas interesantísimas, agitadas y fecundas discusiones sobre la resolución de distintos tipos de ecuaciones cúbicas (de tercer grado). Sus diatribas, en muchos casos, se dilucidaban en debates públicos a los que se retaban mediante pasquines. A pesar de que el tono de estos y de aquellas (pasquines y diatribas) distaba mucho de ser correcto, sirvieron para dar un gran impulso a la resolución de ecuaciones de grado superior.

Los sistemas de ecuaciones se plantearon y resolvieron de forma simultánea a las ecuaciones, ya que el paso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a una ecuación con una incógnita no supone ningún problema especial.

Históricamente, los sistemas de ecuaciones lineales no han sido un reto especialmente difícil. Ya en el siglo II a.C., los chinos resolvían sistemas lineales de varias ecuaciones con el mismo número de incógnitas, mediante un método elegante y potente, similar al que se usa en la actualidad.

DEBERÁS RECORDAR

- Qué entendemos por ecuación y por su solución.
- En qué consisten y cómo se manejan las desigualdades.

1 Ecuaciones de segundo grado

Cálculo mental

Resuelve sin utilizar la fórmula y, si es posible, a ojo:

a) $x^2 = 9$

b) $x^2 - 9 = 0$

c) $5x^2 - 20 = 0$

d) $3x^2 - 300 = 0$

e) $(x-5)^2 = 25$

f) $(x-5)^2 = 4$

g) $3(x-2)^2 = 3$

h) $3(x-2)^2 - 3 = 0$

i) $7(x-4)^2 = 63$

j) $7(x-4)^2 - 63 = 0$

Ten en cuenta

Las ecuaciones incompletas también se pueden resolver por la fórmula anterior, pero es mucho más cómodo resolverlas mediante el procedimiento adjunto.

Las ecuaciones de segundo grado son de la siguiente forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Ecuaciones completas

Cuando $b \neq 0$ y $c \neq 0$, se dice que la ecuación es completa y se resuelve aplicando la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \begin{cases} \text{Si } b^2 - 4ac > 0, \text{ hay dos soluciones.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac = 0, \text{ hay una solución.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac < 0, \text{ no hay ninguna solución.} \end{cases}$$

Por ejemplo, la ecuación $x^2 + x - 2 = 0$ es completa. En ella, $a = 1$, $b = 1$, $c = -2$. La resolvemos aplicando la fórmula:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \end{array} \right\} \text{ Tiene dos soluciones.}$$

Ecuaciones incompletas

Si $b = 0$ o $c = 0$, la ecuación se llama incompleta y se puede resolver con mucha sencillez, sin necesidad de aplicar la fórmula anterior:

• Si $b = 0$ → Despejamos directamente x^2 . Por ejemplo:

$$3x^2 - 48 = 0 \rightarrow 3x^2 = 48 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

• Si $c = 0$ → Factorizamos sacando factor común. Por ejemplo:

$$2x^2 - x = 0 \rightarrow x(2x - 1) = 0 \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ 2x - 1 = 0 \rightarrow x_2 = 1/2 \end{array} \right.$$

Ejercicio resuelto

Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

b) $5x^2 - 7x + 3 = 0$

c) $5x^2 + 45 = 0$

a) $x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18} = \frac{-6}{18} = \frac{-1}{3}$. Solución única.

b) $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 60}}{10} = \frac{7 \pm \sqrt{-11}}{10}$. Sin solución.

c) $5x^2 + 45 = 0 \rightarrow 5x^2 = -45 \rightarrow x^2 = -9 \rightarrow x = \pm\sqrt{-9}$. Sin solución.

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $10x^2 - 3x - 1 = 0$

b) $x^2 - 20x + 100 = 0$

c) $3x^2 + 5x + 11 = 0$

d) $2x^2 - 8x + 8 = 0$

2 Resuelve estas ecuaciones:

a) $2x^2 - 50 = 0$

b) $3x^2 + 5 = 0$

c) $7x^2 + 5x = 0$

d) $2x^2 + 10x = 0$

Hay ecuaciones que no son de primer ni de segundo grado, pero que podrás resolver aplicando lo que ya sabes. Veamos algunos ejemplos.

No lo olvides

Para resolver una ecuación de este tipo:

$$[\dots] \cdot [\dots] \cdot [\dots] = 0$$

es decir, “producto de varios factores igualado a cero”, igualamos a cero cada uno de los factores y resolvemos las correspondientes ecuaciones.

Ecuaciones factorizadas

Queremos resolver la ecuación $x(x-1)(x^2-5x+6) = 0$.

En el primer miembro aparece el producto de tres factores. Para que un producto sea cero, es necesario que uno de los factores sea cero.

Por tanto, igualamos a cero cada uno de los factores:

$$x(x-1)(x^2-5x+6) = 0 \begin{cases} x_1 = 0 \\ x-1 = 0 \rightarrow x_2 = 1 \\ x^2-5x+6 = 0 \begin{cases} x_3 = 2 \\ x_4 = 3 \end{cases} \end{cases}$$

Ecuaciones con radicales

Resolvamos la ecuación $\sqrt{x^2+7} + 2 = 2x$:

- Aislamos el radical en un miembro, pasando al otro lo demás:

$$\sqrt{x^2+7} = 2x-2$$

- Elevamos al cuadrado los dos miembros:

$$(\sqrt{x^2+7})^2 = (2x-2)^2 \rightarrow x^2+7 = 4x^2-8x+4$$

- Pasamos todo a un miembro y lo ordenamos:

$$x^2+7-4x^2+8x-4 = 0 \rightarrow -3x^2+8x+3 = 0$$

- Resolvemos la ecuación obtenida: ($a = -3$, $b = 8$, $c = 3$)

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64+36}}{-6} = \frac{-8 \pm \sqrt{100}}{-6} = \frac{-8 \pm 10}{-6} \begin{cases} x_1 = -1/3 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- En este tipo de ecuaciones (con radicales), al elevar al cuadrado (2.º paso), pueden aparecer soluciones falsas. Por eso, es **necesario comprobar las soluciones obtenidas** sustituyéndolas en la ecuación inicial. En este caso, $x = -1/3$ no es solución, pero $x = 3$ sí lo es.

La ecuación tiene una solución: $x = 3$

No lo olvides

Para resolver una ecuación en la que aparece un radical:

- Se aísla el radical en uno de los miembros.
- Se elevan al cuadrado los dos miembros, con lo que desaparece el radical.
- Se resuelve la ecuación resultante.
- Se comprueba la validez de cada solución sobre la ecuación inicial.

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(x-4)(x-6) = 0$

b) $(x+2)(x-3) = 0$

c) $x(x+1)(x-5) = 0$

d) $(3x+1)(2x-3) = 0$

e) $x(x^2-64) = 0$

f) $(2x+1)(x^2+5x-24) = 0$

2 Resuelve.

a) $\sqrt{x}-3 = 0$

b) $\sqrt{x}+2 = x$

c) $\sqrt{4x+5} = x+2$

d) $\sqrt{x+1}-3 = x-8$

e) $\sqrt{2x^2-2} = 1-x$

f) $\sqrt{3x^2+4} = \sqrt{5x+6}$

Ecuaciones con la x en el denominador

Entrénate

1 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{10}{x+3} + 5 = 4x - 1$

b) $\frac{2000}{x} + 25 = \frac{2000}{x-4}$

c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{4}$

2 Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 4 = 0$

d) $x^4 - 25x^2 = 0$

e) $x^4 - 3x^2 + 4 = 0$

Resolvamos la ecuación $\frac{200}{x} + 5 = \frac{200}{x-2}$:

• Para suprimir los denominadores, multiplicamos todo por $x \cdot (x-2)$:

$$200(x-2) + 5x(x-2) = 200x \rightarrow 200x - 400 + 5x^2 - 10x = 200x \rightarrow \\ \rightarrow 5x^2 - 10x - 400 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 80 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 320}}{2} \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = -8 \end{cases}$$

• Comprobamos en la ecuación inicial y vemos que ambas soluciones son válidas.

Por tanto, la ecuación inicial tiene dos soluciones: $x = -8$ y $x = 10$.

Ecuaciones bicuadradas: $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Son ecuaciones de 4.º grado sin términos de grado impar. Para resolverlas, hacemos $x^2 = z$ y, por tanto, $x^4 = z^2$. Se obtiene así una ecuación de segundo grado cuya incógnita es z :

$$az^2 + bz + c = 0$$

Una vez resuelta, se obtienen los correspondientes valores de x . Por cada valor positivo de z habrá dos valores de x , pues $x^2 = z \rightarrow x = \pm\sqrt{z}$.

Ejercicio resuelto

Resolver la ecuación $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \xrightarrow{x^2=z} z^2 - 13z + 36 = 0$$

$$z = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2} \rightarrow \begin{cases} z = 9 \rightarrow x = \pm 3 \\ z = 4 \rightarrow x = \pm 2 \end{cases}$$

Soluciones: $x_1 = 3$, $x_2 = -3$, $x_3 = 2$, $x_4 = -2$

Actividades

3 Un vendedor callejero lleva un cierto número de relojes, por los que piensa sacar 200 €. Pero comprueba que dos de ellos están deteriorados. Aumentando el precio de los restantes en 5 €, consigue recaudar la misma cantidad. ¿Cuántos relojes llevaba?

☞ Llevaba x relojes. El precio de cada uno iba a ser $\frac{200}{x}$.

4 El lado menor de un triángulo rectángulo mide 5 cm. Calcular el otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 1 cm más que él.

☞ Si los catetos miden 5 cm y x cm, la hipotenusa medirá $\sqrt{x^2 + 25}$ cm.

5 Un grupo de amigos alquilan un autocar por 2 000 € para una excursión.

Fallan 4 de ellos, por lo que los restantes deben pagar 25 € más cada uno.

¿Cuántos había al principio?

6 En un triángulo rectángulo, un cateto mide 8 cm. Calcula la longitud del otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 2 cm más que él.

Vamos a recordar qué son los sistemas de ecuaciones y cómo se resuelven.

Dos ecuaciones forman un **sistema de ecuaciones** cuando lo que pretendemos de ellas es encontrar su solución común.

Si ambas ecuaciones son lineales, se dice que el sistema es lineal.

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Resolución de un sistema lineal

Método de sustitución

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye en la otra. Se obtiene, así, una ecuación con una incógnita. Se resuelve. Su solución se sustituye en la primera ecuación. Por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{cases} \rightarrow x = 15 - 2y \rightarrow 3(15 - 2y) - 5y = 1 \rightarrow \dots \rightarrow y = 4 \rightarrow \\ \rightarrow x = 15 - 2 \cdot 4 = 15 - 8 = 7$$

Solución: $x = 7$, $y = 4$

Método de igualación

Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan los resultados. Al igual que en el método anterior, también en este se obtiene una ecuación con una incógnita. Por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + 5y}{3} \\ x = 15 - 2y \end{cases} \rightarrow \frac{1 + 5y}{3} = 15 - 2y \rightarrow y = 4 \\ x = 15 - 2 \cdot 4 = 7$$

Solución: $x = 7$, $y = 4$

Método de reducción

Se preparan las dos ecuaciones (multiplicando por los números que convenga) para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas. Al restarlas se obtiene una ecuación sin esa incógnita. Por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x + 5y = 76 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \begin{array}{l} \xrightarrow{1.^a \cdot 4} \\ \xrightarrow{2.^a \cdot 3} \end{array} \begin{array}{l} 12x + 20y = 304 \\ 12x - 6y = 18 \end{array} \\ \text{Restando:} \qquad \qquad \qquad \underline{26y = 286} \rightarrow y = 11$$

$$3x + 5 \cdot 11 = 76 \rightarrow x = 7$$

Solución: $x = 7$, $y = 11$

Entrénate

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando los tres métodos que conoces: sustitución, igualación y reducción:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 2y = -5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -x - 3y = -15 \\ x - y = -5 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - y = 1/6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 4y = 0 \\ 2x - 4y = -3 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = -1 \end{cases}$ h) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x - \frac{1}{2}y = -1 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ j) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 6x + 3y = -15 \end{cases}$

4 Sistemas de ecuaciones no lineales

Ten en cuenta

Los sistemas de ecuaciones no lineales se resuelven de forma esencialmente igual a los sistemas lineales.

No lo olvides

Si hay raíces o incógnitas en el denominador, al resolver la ecuación puede aparecer alguna solución falsa. Por eso, en tales casos, es necesario comprobar todas las soluciones sobre el sistema inicial.

Son aquellos en los que una de las dos ecuaciones, o ambas, son no lineales, es decir, tienen monomios de segundo grado (x^2 , y^2 , $x \cdot y$) o de grado superior, o radicales, o alguna incógnita en el denominador...

Para resolverlos, podemos despejar una incógnita en una ecuación y sustituir el resultado en la otra (método de sustitución) o eliminar una incógnita simplificando entre las dos ecuaciones (método de reducción) o cualquier otro método por el que podamos pasar a una ecuación con una incógnita.

Ejercicio resuelto

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\text{a) } \begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \qquad \text{b) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$$

a) Aplicamos el método de sustitución:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} &\rightarrow y = 1 + x \\ &\rightarrow x^2 + (1 + x)^2 = 5 \rightarrow x^2 + 1 + x^2 + 2x = 5 \rightarrow \\ &\rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \rightarrow y_1 = 1 + 1 = 2 \\ x_2 = -2 \rightarrow y_2 = 1 - 2 = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Hay dos soluciones: $x_1 = 1$, $y_1 = 2$

$$x_2 = -2, y_2 = -1$$

b) Aplicamos el método de reducción:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$$

$$\text{Sumando: } 2x^2 = 98 \rightarrow x^2 = 49 \rightarrow x = \pm 7$$

$$\text{Si } x = 7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$$

$$\text{Si } x = -7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = 7$, $y_1 = 3$

$$x_2 = 7, y_2 = -3$$

$$x_3 = -7, y_3 = 3$$

$$x_4 = -7, y_4 = -3$$

Actividades

1 Resuelve los siguientes sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 15 \\ x \cdot y = 100 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 21 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x - y = 2 \\ x^2 + xy = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} y = \sqrt{x + 1} \\ y = 5 - x \end{cases}$$

Sistemas de inecuaciones

Observa

Cuando decimos “las soluciones *son* $x < 3$ ” queremos decir “las soluciones *son* todos los números menores que 3”.

Análogamente, $x \geq -1$ significa “el número -1 y todos los números mayores que él”.

Si deseamos encontrar las soluciones comunes a varias inecuaciones, decimos que estas forman un **sistema de inecuaciones**.

Por ejemplo:

- Las soluciones de $2x + 1 < 7$ son $x < 3$

- Las soluciones de $7 - 5x \leq 12$ son $x \geq -1$

Por tanto, las soluciones del sistema formado por ambas ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 1 < 7 \\ 7 - 5x \leq 12 \end{cases} \text{ son } -1 \leq x < 3$$

Problema resuelto

1. Resolver este sistema de inecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 2 \leq 17 \\ 5 - x < 2 \end{cases}$$

1.ª inecuación: $3x + 2 \leq 17 \rightarrow 3x \leq 15 \rightarrow x \leq 5$

2.ª inecuación: $5 - x < 2 \rightarrow -x < -3 \rightarrow x > 3$

Sistema: *Solución:* $3 < x \leq 5$

La solución del sistema es cualquier número mayor que 3, que no supere al 5.

2. ¿Cuánto vale un chocolate con churros en el bar de la esquina? Ayer fuimos 6 personas y nos costó más de 20 €. Hoy hemos ido 8 personas y ha costado menos de 30 €.

2. Llamamos x al precio del chocolate con churros:

Ayer: $6x > 20 \rightarrow x > 3,3\bar{3} \rightarrow x \geq 3,34 \text{ €}$

Hoy: $8x < 30 \rightarrow x < 3,75 \text{ €} \rightarrow x \leq 3,74 \text{ €}$

Por tanto, su precio está comprendido entre 3,34 € y 3,74 €. Probablemente, sea 3,50 €.

Actividades

3 Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones:

a) $\begin{cases} 3x \leq 15 \\ 2x \geq 8 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 5 \leq x + 12 \\ x + 4 < 5x - 8 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x - 7 > 23 \\ 3 - 2x > x - 30 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -2x - 1 \geq 14 - 8x \\ 5x + 8 > 6x + 5/2 \end{cases}$

4 Tres amigos contratan tres viajes a Praga. Les cuesta algo menos de 2 200 € en total. Cinco amigos contratan el mismo viaje. Por ser cinco, les hacen una bonificación de 500 €, y pagan algo más de 3 000 €.

¿Cuánto vale ese viaje a Praga, si sabemos que es múltiplo de 10 €?

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Ecuaciones: soluciones por tanteo

1 $\nabla\nabla\nabla$ Busca por tanteo una solución exacta de cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $2^{x+3} = 32$ b) $\sqrt{2x+1} = 9$
 c) $x^{x+1} = 8$ d) $(x-1)^3 = 27$

2 $\nabla\nabla\nabla$ Busca por tanteo, con la calculadora, una solución aproximada hasta las décimas.

a) $x^3 + x^2 = 20$ b) $x^x = 35$
 c) $3^x = 1000$ d) $x^3 = 30$

Ecuaciones de segundo grado

3 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x^2 - 2x - 3 = 0$ b) $2x^2 - 7x - 4 = 0$
 c) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ d) $x^2 + x + 2 = 0$

4 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve:

a) $4x^2 - 64 = 0$ b) $3x^2 - 9x = 0$
 c) $2x^2 + 5x = 0$ d) $2x^2 - 8 = 0$

5 $\nabla\nabla\nabla$ Las siguientes ecuaciones son de segundo grado e incompletas. Resuélvelas sin aplicar la fórmula general:

a) $(3x+1)(3x-1) + \frac{(x-2)^2}{2} = 1 - 2x$

b) $\frac{x^2+2}{3} - \frac{x^2+1}{4} = \frac{x+5}{12}$

c) $\frac{(2x-1)(2x+1)}{3} = \frac{3x-2}{6} + \frac{x^2}{3}$

6 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $(2x+1)^2 = 1 + (x-1)(x+1)$

b) $\frac{(x+1)(x-3)}{2} + x = \frac{x}{4}$

c) $x + \frac{3x+1}{2} - \frac{x-2}{3} = x^2 - 2$

Otros tipos de ecuaciones

7 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(2x-5)(x+7) = 0$ b) $(x-2)(4x+6) = 0$
 c) $(x+2)(x^2+4) = 0$ d) $(3x+1)(x^2+x-2) = 0$

8 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve.

a) $x - \sqrt{x} = 2$ b) $x - \sqrt{25-x^2} = 1$
 c) $x - \sqrt{169-x^2} = 17$ d) $x + \sqrt{5x+10} = 8$
 e) $\sqrt{2x^2+7} = \sqrt{5-4x}$ f) $\sqrt{x+2} + 3 = x-1$

9 $\nabla\nabla\nabla$ Resuelve estas ecuaciones:

a) $\frac{2}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{3x}{2}$ b) $\frac{800}{x} - 50 = \frac{600}{x+4}$
 c) $\frac{1}{x^2} - 2 = \frac{3-x}{3x^2}$ d) $\frac{x}{2} = 1 + \frac{2x-4}{x+4}$

Inecuaciones

10 $\nabla\nabla\nabla$ Halla el conjunto de soluciones de cada inecuación y represéntalo.

a) $3x - 7 < 5$ b) $2 - x > 3$
 c) $7 \geq 8x - 5$ d) $1 - 5x \leq -8$
 e) $6 < 3x - 2$ f) $-4 \geq 1 - 10x$

11 $\nabla\nabla\nabla$ Halla el conjunto de soluciones de los siguientes sistemas de inecuaciones:

a) $\begin{cases} x-1 > 0 \\ x+3 > 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 2+x \geq 0 \end{cases}$
 c) $\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-4 \leq 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x > 0 \\ 3-x \leq 0 \end{cases}$

Sistemas lineales

12 $\nabla\nabla\nabla$ Completa en tu cuaderno para que los siguientes sistemas tengan como solución $x = -1, y = 2$:

a) $\begin{cases} x-3y = \dots \\ 2x+y = \dots \end{cases}$ b) $\begin{cases} y-x = \dots \\ 2y+x = \dots \end{cases}$
 c) $\begin{cases} 3x+y = \dots \\ \dots + y/2 = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} \dots - 2x = 4 \\ 3y + \dots = 1 \end{cases}$

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

13 ▼▼▼ Resuelve estos sistemas por el método de sustitución:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 5y = 5 \\ 4x + y = -1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 8x - 7y = 15 \\ x + 6y = -5 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ 5x + 4y = 7 \end{cases}$$

14 ▼▼▼ Resuelve los siguientes sistemas por el método de igualación:

$$\text{a) } \begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = \frac{x - 3}{2} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 5x + y = 8 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 6y = -2 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 4x - 5y = -2 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$$

15 ▼▼▼ Resuelve los siguientes sistemas por el método de reducción:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ 4x - 3y = -4 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 6y = -4 \\ 3x - 5y = 11 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 5x - 2y = 3 \\ 10x + 3y = -1 \end{cases}$$

16 ▼▼▼ Resuelve por el método que consideres más adecuado:

$$\text{a) } \begin{cases} 7x + 6y = 2 \\ y + 5 = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3(x + 2) = y + 7 \\ x + 2(y + 1) = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ 2(x + y) = 16 \end{cases}$$

Sistemas no lineales

17 ▼▼▼ Halla las soluciones de estos sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 1 \\ xy + 2y = 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + y = 3 \\ xy - y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x - y = 3 \\ 2x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

18 ▼▼▼ Resuelve los sistemas siguientes por el método de reducción y comprueba que tienen cuatro soluciones:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 74 \\ 2x^2 - 3y^2 = 23 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3x^2 - 5y^2 = 7 \\ 2x^2 = 11y^2 - 3 \end{cases}$$

Aplica lo aprendido

19 ▼▼▼ El área de una lámina rectangular de bronce es de 60 cm^2 y su base mide $\frac{5}{3}$ de su altura. Halla las dimensiones de la lámina.

20 ▼▼▼ Una persona compra un equipo de música y un ordenador por $2\,500 \text{ €}$, y los vende, después de algún tiempo, por $2\,157,5 \text{ €}$. Con el equipo de música perdió el 10% de su valor, y con el ordenador, el 15%. ¿Cuánto le costó cada uno?

21 ▼▼▼ En una papelería, el precio de una copia en color es $0,75 \text{ €}$ y el de una en blanco y negro es $0,20 \text{ €}$. En una semana, el número de copias en color fue la décima parte que en blanco y negro y se recaudaron 110 € . Calcula cuántas copias se hicieron de cada tipo.

22 ▼▼▼ Se mezclan 8 l de aceite de 4 €/l con otro más barato para obtener 20 l a $2,5 \text{ €/l}$. ¿Cuál es el precio del aceite barato?

23 ▼▼▼ La suma de dos números consecutivos es menor que 27. ¿Cuáles pueden ser esos números si sabemos que son de dos cifras?

24 ▼▼▼ Un grupo de amigos han reunido 50 € para ir a una discoteca. Si la entrada cuesta 6 € , les sobra dinero, pero si cuesta 7 € no tienen bastante. ¿Cuántos amigos son?

25 ▼▼▼ En un rectángulo en el que la base mide 3 cm más que la altura, el perímetro es mayor que 50 pero no llega a 54 . ¿Cuál puede ser la media de la base?

26 ▼▼▼ Cuatro barras de pan y seis litros de leche cuestan $6,80 \text{ €}$; tres barras de pan y cuatro litros de leche cuestan $4,70 \text{ €}$. ¿Cuánto vale una barra de pan? ¿Cuánto cuesta un litro de leche?

- 27** ▽▽▽ Una empresa aceitera ha envasado 3 000 l de aceite en 1 200 botellas de 2 l y de 5 l. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado?
- 28** ▽▽▽ Un test consta de 48 preguntas. Por cada acierto se suman 0,75 puntos y por cada error se restan 0,25. Mi puntuación fue de 18 puntos. ¿Cuántos aciertos y errores tuve, si contesté a todo?
- 29** ▽▽▽ Un fabricante de bombillas obtiene un beneficio de 0,80 € por cada pieza que sale de su taller para la venta, pero sufre una pérdida de 1 € por cada pieza defectuosa que debe retirar. En un día ha fabricado 2 255 bombillas, obteniendo unos beneficios de 1 750 €. ¿Cuántas bombillas válidas y cuántas defectuosas se fabricaron ese día?
- 30** ▽▽▽ Una empresa de alquiler de coches cobra por día y por kilómetros recorridos. Un cliente pagó 160 € por 3 días y 400 km, y otro pagó 175 € por 5 días y 300 km. Averigua cuánto cobran por día y por kilómetro.

- 31** ▽▽▽ La edad de un padre es hoy el triple que la del hijo y hace 6 años era cinco veces la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno?

✎

	EDAD ACTUAL	EDAD HACE 6 AÑOS
PADRE	x	$y - 6$
HIJO	y	$x - 6$

- 32** ▽▽▽ En una cafetería utilizan dos marcas de café, una de 6 €/kg y otra de 8,50 €/kg. El encargado quiere preparar 20 kg de una mezcla de los dos cuyo precio sea 7 €/kg. ¿Cuánto tiene que poner de cada clase?

✎

	CANTIDAD	PRECIO	COSTE
CAFÉ A	x	6	$6x$
CAFÉ B	y	8,50	$8,50y$
MEZCLA	20	7	140

Autoevaluación

¿Dominas la resolución de ecuaciones de segundo grado y de otros tipos de ecuaciones?

1 Resuelve:

a) $5(x - 3)^2 + x^2 - 46 = -(2x + 1)(1 - 3x)$

b) $(x + 3)(2x - 5) = 0$

c) $\frac{3}{2x} - \frac{3}{4x} = \frac{x + 1}{8}$

¿Sabes resolver inecuaciones?

2 Resuelve y representa las soluciones.

a) $\frac{2(x - 5)}{3} \leq 2x - 6$

b) $\begin{cases} 5x - 3 > x + 5 \\ x - 6 \leq 0 \end{cases}$

¿Sabes resolver con soltura sistemas de ecuaciones?

3 Resuelve:

a) $\begin{cases} y + 1 = 6 - x \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 12 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{x}{3} + y = \frac{5}{2} \\ 2x + 6y = 15 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 - y^2 = 34 \\ 2x^2 - y^2 = -7 \end{cases}$

¿Has adquirido destreza en el planteamiento y la resolución de problemas algebraicos?

- 4** Dos bocadillos y un refresco cuestan 5,35 €; tres bocadillos y dos refrescos cuestan 8,60 €. Calcula el precio de un bocadillo y el de un refresco.
- 5** Los lados de un triángulo miden 18 cm, 16 cm y 9 cm. Si restamos una misma cantidad a los tres lados, obtenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué cantidad es esa?
- 6** En una empresa alquilan bicicletas a 3 € la hora y motocicletas por 5 € fijos más 2 € por hora. ¿A partir de cuántas horas es más económico alquilar una motocicleta que una bicicleta?

4 Funciones. Características

El concepto de función ha ido evolucionando y perfilándose a lo largo del tiempo. ¿Qué requisitos se le ha ido exigiendo a dicho concepto?

- Una función relaciona dos variables.
- Las funciones describen fenómenos naturales.
- Las relaciones funcionales pueden ser descritas mediante fórmulas (relaciones algebraicas).
- Las funciones pueden ser representadas gráficamente.

Oresme (matemático francés del siglo XIV) afirmó en 1350 que las leyes de la naturaleza son relaciones de dependencia entre “dos cantidades”. Puede considerarse una primera aproximación al concepto de función.

Galileo (finales del siglo XVI) utiliza por primera vez la experimentación cuantitativa (diseña, experimenta, mide, anota) para establecer relaciones numéricas que describan fenómenos naturales.

Descartes (siglo XVII), con su algebrización de la geometría, propicia que las funciones puedan ser representadas gráficamente.

Leibniz, en 1673, utiliza por primera vez la palabra *función* para designar estas relaciones.

Euler, entre 1748 y 1755, fue perfilando el concepto, al que dio precisión y generalidad, admitiendo, finalmente, que una relación entre dos variables puede ser función aunque no haya una expresión analítica que la describa. El propio Euler fue quien aportó la nomenclatura $f(x)$.

DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se representan y se interpretan funciones descritas mediante enunciados.
- Qué es y cómo se obtiene la pendiente de un segmento.

Una función liga dos variables numéricas a las que, habitualmente, se las llama x e y :

x es la **variable independiente** y es la **variable dependiente**

La función, que se suele denotar por $y = f(x)$, asocia a cada valor de x un **único** valor de y :

$$x \rightarrow y = f(x)$$

Para visualizar el comportamiento de una función, recurrimos a su representación gráfica: sobre unos ejes cartesianos con sendas escalas, representamos las dos variables:

La x sobre el eje horizontal (eje de **abscisas**).

La y sobre el eje vertical (eje de **ordenadas**).

Cada punto de la gráfica tiene dos **coordenadas**, su abscisa, x , y su ordenada, y .

Se llama **dominio de definición** de una función, f , y se designa por $Dom f$, al conjunto de valores de x para los cuales existe la función.

Se llama **recorrido** de f al conjunto de valores que toma la función. Es decir, al conjunto de valores de y para los cuales hay un x tal que $f(x) = y$.

Actividades

1 Esta gráfica corresponde a la función:
profundidad dentro del agua $\rightarrow$ *presión*

- ¿Cuáles son las variables?
- ¿Qué escalas se utilizan?
- Di cuál es el dominio de definición y el recorrido.

2 Esta gráfica muestra la humedad relativa del aire en una ciudad.

- ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente? ¿Qué escalas se utilizan?

- ¿Durante cuánto tiempo se midió la humedad?
- ¿Entre qué valores varió la humedad?

La gráfica describe la temperatura a la que sale el agua de un grifo.

- ¿Cuáles son las dos variables?
- Explica por qué es una función.
- ¿Cuáles son el dominio de definición y el recorrido?

Una de estas dos gráficas corresponde a una función, y la otra, no. Identifica cada cual, razonadamente.

Tanto para el estudio de las matemáticas como para otras ciencias o en la vida cotidiana, nos encontramos frecuentemente con funciones.

Las funciones nos vienen dadas de muy diversas formas: mediante su *gráfica*, por una *tabla de valores*, por una *fórmula* o mediante una *descripción verbal* (*enunciado*).

Mediante su expresión gráfica

Las siguientes dos funciones vienen dadas por sus representaciones gráficas:

Entrénate

- 1 El consumo de agua de un colegio viene dado por esta gráfica:

Haz un pequeño informe relacionando la gráfica con los movimientos del colegio (horas de entrada y de salida, recreos...).

ÍNDICE DE LA BOLSA EN UN AÑO

VELOCIDAD DE UN CICLISTA EN CADA INSTANTE DE UN RECORRIDO

Como mejor se puede apreciar el comportamiento global de una función es mediante su **representación gráfica**. Por eso, siempre que pretendamos analizar una función, intentaremos representarla gráficamente, cualquiera que sea la forma en la cual, en principio, nos venga dada.

Mediante un enunciado

Cuando una función viene dada por un enunciado o una descripción (como la que se hace en la siguiente actividad 1 para describir el recorrido de Alberto hasta la escuela), la idea que nos podemos hacer de ella es, casi siempre, cuantitativamente poco precisa.

Actividades

- Haz una gráfica en la que se vea representado el recorrido de Alberto desde su casa hasta el colegio, en función del tiempo: de casa salió a las 8:30 h y fue seguidito hasta casa de su amigo Íker. Lo esperó un rato sentado en un banco y luego se fueron juntos, muy despacio, hacia el colegio. Cuando ya estaban llegando, se dio cuenta de que se había dejado la cartera en el banco. Volvió corriendo, la recuperó y llegó al colegio a las 9 en punto.
- Vamos a analizar la gráfica de arriba que describe la velocidad del ciclista:
  - ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el recorrido?
  - En los primeros 15 minutos circula en llano. ¿A qué velocidad lo hace? ¿Qué distancia recorre?
  - Entre el minuto 18 y el 27 va cuesta arriba. Di a qué velocidad.
  - Señala un intervalo de 5 minutos en el que marcha cuesta abajo. ¿A qué velocidad lo hace?

Ejemplo

Alguien que gane 32 500 €:

- Se sitúa en la 4.ª fila.
- Por los primeros 26 000 € paga 6 360 €, y por el resto, el 37%:
 $32\,500 - 26\,000 = 6\,500$ €
 $37\% \text{ de } 6\,500 = 6\,500 \times 0,37 = 2\,405$ €

Por tanto, paga $6\,500 + 2\,405$.

Es decir, si gana 32 500 €, ha de pagar 8 905 €.

Mediante una tabla de valores

Con frecuencia se nos dan los valores de una función mediante una tabla en la cual se obtienen directamente los datos buscados. Sin embargo, en otros casos, como en la tabla siguiente, hay que efectuar complejos cálculos para obtener lo que se busca.

Esta tabla de valores permite calcular lo que cada persona debe pagar a Hacienda un cierto año (cuota íntegra) en función de lo que gana (base liquidable).

BASE LIQUIDABLE HASTA EUROS	CUOTA ÍNTEGRA EUROS	RESTO BASE LIQUIDABLE HASTA EUROS	TIPO APLICABLE %
0	0	4 000	15
4 000	600	10 000	25
14 000	3 000	12 000	28
26 000	6 360	20 000	37
46 000	13 760	en adelante	45

Mediante su expresión analítica o fórmula

La **expresión analítica** es la forma más precisa y operativa de dar una función. Pero requiere un minucioso estudio posterior.

Veamos algunos ejemplos:

▼ EJEMPLO 1

Una bola que se deja caer por un plano levemente inclinado lleva una aceleración de $0,2 \text{ m/s}^2$.

La distancia, e , en metros, que recorre en función del tiempo, t , en segundos, viene dada por la fórmula $e = 0,1t^2$.

▼ EJEMPLO 2

El volumen de una esfera en función de su radio es:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (r \text{ en cm, } V \text{ en cm}^3)$$

Actividades

3 En el EJEMPLO 1, calcula la distancia que recorre la bola en 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. ¿A qué tiempo corresponde una distancia de 2 m?

4 En el EJEMPLO 2, halla el volumen de una esfera de radio 5 cm y el radio de una esfera de volumen 800 cm^3 .

5 El coste de una línea de telefonía móvil para internet es $C = 10 + 1,5t$ (C , en €; t , en horas). Representa la función.

6 Esta tabla muestra cómo varía la cantidad de agua que hay en un depósito cuando se abre un desagüe:

t (min)	0	1	2	3	5
V (l)	20	18	16	14	10

Representa la función *tiempo* $\rightarrow$ *volumen*.

Entrénate

Un representante de ordenadores recibe cada mes 1 000 € fijos más 50 € por cada aparato vendido. Esta es la gráfica de la función:

aparatos vendidos → ganancias mensuales

Explica por qué no se pueden unir los puntos.

La función de la izquierda es continua en todo su dominio de definición.

La función de la derecha no es continua, porque presenta una discontinuidad en el punto de abscisa a .

Hay distintos tipos de discontinuidad. Observa algunos:

Una función es **continua** cuando no presenta discontinuidades de ningún tipo.

Se puede decir de una función que es **continua en un intervalo** $[a, b]$ si no presenta ninguna discontinuidad en él.

Observa

La primera gráfica, discontinua, refleja el pago “por horas” (hora empezada, hora pagada). La segunda consiste en pagar exactamente lo que se gasta. En la tercera, hay un pago inicial (por entrar en el aparcamiento, 2 €) y, a continuación, se paga lo que se gasta.

Hasta hace poco, los aparcamientos cobraban “por horas”. Esto quiere decir que solo por entrar ya se pagaba 1 h. Si se estaba 1 h y 10 min se pagaban 2 h. La primera de las tres gráficas siguientes describe esta forma de pago:

Los usuarios prefieren que las tarifas se rijan por la función continua de en medio. Los representantes de los aparcamientos preferirían, si se quiere que la función sea continua, la de la derecha.

Actividades

- ¿Cuánto vale aparcar media hora según cada modelo ①, ② y ③?
- ¿Cuánto dinero cuesta aparcar 1 h 15 min según cada modelo?
- ¿Y aparcar 4 h y 6 minutos?
- Propón un modelo de tarifa que sea intermedio entre la preferencia de los usuarios y la de los representantes de los aparcamientos.

4 Crecimiento, máximos y mínimos

La función f es **creciente** en este tramo porque
si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$.

Análogamente, una función es **decreciente** en un intervalo cuando

si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) > f(x_2)$.

Una función puede ser creciente en unos intervalos y decreciente en otros.

La función puede tomar en otros puntos valores mayores que un máximo relativo y menores que un mínimo relativo.

Una función tiene un **máximo relativo** en un punto cuando en él la función toma un valor mayor que en los puntos próximos. En tal caso, la función es creciente hasta el máximo y decreciente a partir de él.

Análogamente, si f tiene un **mínimo relativo** en un punto, es decreciente antes del punto y creciente a partir de él.

Entrénate

Observa la gráfica del consumo de agua de un colegio que aparece en el margen de la página 47 y responde:

- ¿Cuándo el consumo es creciente?
¿Cuándo es decreciente?
- ¿Durante qué horas se alcanza los valores máximos y mínimos de consumo de agua?

Ejercicio resuelto

Decir los intervalos en que es creciente y en los que es decreciente la función dada gráficamente a la derecha. ¿Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos?

La función está definida entre -7 y 11 .

Es creciente en los intervalos $(-7, -3)$ y $(1, 11)$.

Es decreciente en el intervalo $(-3, 1)$.

Tiene un máximo relativo en el punto de abscisa -3 . Su valor es 2 .

Tiene un mínimo relativo en el punto de abscisa 1 . Su valor es -5 .

Hay puntos en los que la función toma valores menores que en el mínimo relativo. Por ejemplo, para $x = -7$, la función toma el valor -6 .

Actividades

1 De la función de la derecha di:

- En qué intervalos es creciente y en cuáles es decreciente.
- Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos.

La siguiente gráfica muestra la *cantidad media de ejemplares por hectárea* que hay de una cierta especie de planta a distintas *alturas*:

Entrénate

- 1 La cantidad de radiactividad que posee una sustancia se reduce a la mitad cada año. La gráfica adjunta describe la cantidad de radiactividad que hay en una porción de esa sustancia al transcurrir el tiempo.

¿A cuánto *tiende* la radiactividad con el paso del tiempo?

- 2 La cisterna de unos servicios públicos se llena y se vacía, automáticamente, cada dos minutos, siguiendo el ritmo de la gráfica adjunta.

- a) Dibuja la gráfica correspondiente a 10 min.
- b) ¿Cuánta agua habrá en la cisterna en los siguientes instantes?
- I) 17 min   II) 40 min 30 s
III) 1 h 9 min 30 s

Observamos que, a partir de una cierta altura, cuanto más se sube menos ejemplares se encuentran. Y que, a partir de 1600 m, casi no hay plantas de este tipo. Podemos afirmar que:

Cuando la altura aumenta por encima de los 1600 m, el número de plantas tiende a cero.

Hay funciones en las que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarán lejos del intervalo en que han sido estudiadas, porque tienen **ramas** con una **tendencia** muy clara.

Periodicidad

Observamos la variación de la altura de un cestillo de una noria cuando esta da una vuelta. Tarda medio minuto (30 segundos), y en ese tiempo sube, llega al punto más alto, baja y llega al suelo. Pero este movimiento se repite una y otra vez. Su representación gráfica es esta:

En esta función, lo que ocurre en el intervalo $[0, 30]$ se repite reiteradamente. Se trata de una *función periódica* de *periodo* 30.

Función periódica es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. La longitud de ese intervalo se llama **periodo**.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Interpretación de gráficas

- 1 **▼▼▼** Pepe y Susana han medido y pesado a su hijo David cada mes, desde que nació hasta los 21 meses. Estas son las gráficas de la longitud y del peso de David en función de la edad:

- ¿Cuánto medía y pesaba David cuando nació?
- ¿Cuánto creció David los seis primeros meses? ¿Y de los seis a los veintiún meses? ¿En qué meses fue mayor su crecimiento?
- ¿Cuánto aumentó de peso David los dos primeros meses? ¿Y del mes 12 al mes 18?
- ¿Cuánto pesaba David cuando medía 80 cm? ¿Qué edad tenía entonces?

- 2 **▼▼▼** Hemos sacado de la nevera un vaso con agua y lo hemos dejado sobre la mesa de la cocina. Esta gráfica muestra la temperatura del agua en grados centígrados al pasar el tiempo.

- ¿A qué temperatura está el interior de la nevera?
- ¿A qué temperatura está la habitación?
- Imagina que en ese mismo momento sacamos del microondas un vaso con agua a 98 °C y lo dejamos sobre la mesa. Dibuja una gráfica aproximada que muestre la temperatura del agua en este segundo vaso al pasar el tiempo.

Enunciados, fórmulas y tablas

- 3 **▼▼▼** Representa la función $y = x^3 - 3x + 2$ definida en $[-2, 3]$. Para ello, completa en tu cuaderno:

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

¿Cuál es el recorrido de la función?

- 4 **▼▼▼** Tres deportistas han estado nadando durante media hora. Su entrenador ha medido las distancias recorridas cada 5 minutos y ha obtenido los siguientes datos:

TIEMPO (min)	5	10	15	20	25	30
DISTANCIA A (m)	95	235	425	650	875	1100
DISTANCIA B (m)	250	500	750	1000	1250	1500
DISTANCIA C (m)	360	710	1020	1300	1490	1600

- Dibuja la gráfica que relaciona la distancia y el tiempo de cada nadador y descríbelas.
  - ¿Ha habido algún adelantamiento durante la media hora?
  - Calcula la velocidad media de cada uno en todo el recorrido.
  - ¿Cuál es el dominio y el recorrido de cada una de las tres funciones?
- 5 **▼▼▼** Los coches, una vez que se compran, empiezan a perder valor a un ritmo de un 20% anual, aproximadamente.
- Haz una tabla de valores que dé el valor, en años sucesivos, de un coche que costó 12 000 €.
  - Representa gráficamente la función *años transcurridos-valor del coche*.
  - Encuentra una fórmula que permita hallar el precio del coche en función de los años transcurridos.

Características de una función

- 6** ▽ ▽ ▽ De cada una de las siguientes funciones di:
- En qué intervalos crece y en cuáles decrece.
  - Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos.

- 7** ▽ ▽ ▽ Observa las siguientes gráficas de funciones:

- Relaciona cada curva con uno de estos enunciados.
  - Temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa a la nevera.
  - Temperatura de un vaso de agua cuando sale de la nevera y se deja en la mesa.
  - Temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa al congelador.
- Determina a qué tiende cada una cuando crece la variable independiente.

- 8** ▽ ▽ ▽ ¿Es periódica esta función? ¿Cuál es su periodo?

Averigua los valores de la función en los puntos de abscisas $x = 1$, $x = 3$, $x = 20$, $x = 23$ y $x = 42$.

- 9** ▽ ▽ ▽ Continúa esta gráfica sabiendo que se trata de una función periódica. Di cuál es su periodo.

- 10** ▽ ▽ ▽ Observa la gráfica de la función y responde:

- ¿Cuáles son su dominio de definición y su recorrido?
- ¿Tiene máximo y mínimo relativos? En caso afirmativo, ¿cuáles son?
- ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes?
- ¿En qué intervalos es la función creciente y en cuáles es decreciente?

Resuelve problemas

- 11** ▽ ▽ ▽ Esta es la gráfica de la evolución de la temperatura de un enfermo.

- ¿Cuánto tiempo estuvo en observación?
- ¿En qué día la temperatura alcanza un máximo? ¿Y un mínimo?
- ¿En qué intervalos de tiempo crece la temperatura y en cuáles decrece?
- ¿Qué tendencia tiene la temperatura?
- Elabora un pequeño informe interpretando tus resultados.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

- 12** ▼▼▼ Un nadador se deja caer desde un trampolín. Su entrenador ha medido el espacio que recorre cada cuatro décimas de segundo mediante un método fotográfico. Obtiene la siguiente tabla:

TIEMPO (s)	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
ESPACIO (m)	0	0,78	3,13	7,05	12,5	14	14,5	15

El nadador se ha detenido a los 15 metros.

- Representa la gráfica *espacio-tiempo*.
- ¿Sabrías decir en qué momento entró en el agua?
- ¿Qué velocidad estimas que llevaba en el momento de entrar en el agua?
- ¿Qué altura tiene el trampolín?

- 13** ▼▼▼ Cuando una persona sana toma 50 g de glucosa en ayunas, su glucemia (% de glucosa en la sangre) se eleva, en una hora aproximadamente, desde 90 mg/dl, que es el nivel normal, hasta 120 mg/dl.

Luego, en las tres horas siguientes, disminuye hasta valores algo por debajo del nivel normal, y vuelve a la normalidad al cabo de 5 horas.

- Representa la curva de glucemia de una persona sana.
- Di cuál es su máximo, su mínimo y explica su tendencia.

Autoevaluación

¿Sabes interpretar la gráfica correspondiente a una situación real o construirla a partir de un enunciado?

- 1** Un ciclista hace una excursión a un lugar que dista 30 km de su casa. Al cabo de una hora, cuando ha recorrido 15 km, hace una parada de media hora. Reanuda la marcha con la misma velocidad hasta llegar a su destino, donde descansa otra media hora, y regresa al punto de partida a la misma velocidad que a la ida. Representa la gráfica *tiempo-distancia al punto de partida*.

- 2** La siguiente gráfica representa la altura a la que se encuentra, con el paso del tiempo, un globo de hidrógeno que se va elevando... hasta que estalla:

- ¿Cuánto tarda en estallar desde que lo soltamos?
- ¿Qué altura gana entre el minuto 3 y el minuto 6? ¿Y entre el 7 y el 11?
- ¿Cómo es esta función, crece o decrece?
- ¿Cómo continuarías la gráfica si el globo no hubiera estallado?

¿Reconoces las características más relevantes de una función?

- 3** Observa la gráfica y halla:

- Dominio y recorrido.
- Máximos y mínimos.
- Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Dónde es continua y los puntos de discontinuidad.

- 4** a) ¿Es periódica esta función?

¿Cuál es su periodo?

- b) Halla los valores de la función en los puntos de abscisas:

$$x = 2; x = 4; x = 40; x = 42$$

5 Funciones elementales

Después de Euler aún siguió, entre los matemáticos, la discusión sobre qué requisitos eran imprescindibles para definir una función y cuáles no. En 1923 se llegó a la siguiente definición, muy parecida a la que se usa actualmente.

Se dice que y es una función de x si a cada valor de x le corresponde un valor de y . Esta correspondencia se indica mediante la ecuación $y=f(x)$.

Pero en esa búsqueda de la precisión, se generaron una serie de funciones estrafalarias que llevaron a **Poincaré**, en el año 1899, a decir:

“Durante medio siglo hemos visto una masa de funciones extrañas construidas de modo que se parezcan lo menos posible a las *funciones honestas* que sirven a algún propósito. Antes, cuando se inventaba alguna función, era con alguna meta práctica. Hoy son inventadas con el fin de mostrar que el razonamiento de nuestros antecesores fue erróneo”.

En esta unidad vamos a dedicarnos a esas *funciones honestas* que propugnaba el gran Poincaré, esas funciones que sirven para algo más que para construir o desmontar conceptos.

DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se obtienen puntos de una función dada por su expresión analítica.
- Cómo se obtiene la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

Distintos tipos de funciones lineales

Ejemplo

El espacio recorrido con movimiento uniforme (velocidad constante) en función del tiempo es:

$$e = v \cdot t$$

v es la pendiente de la recta que relaciona e con t .

Ejemplos

- El precio de la comida en algunos restaurantes es constante, no depende de la cantidad que nos sirvamos.
- La distancia de un satélite artificial a la Tierra es constante, no varía con el tiempo.

Función de proporcionalidad: $y = mx$

Las funciones de proporcionalidad se representan mediante rectas que pasan por el origen. Describen una proporción entre los valores de las dos variables.

La pendiente de la recta es la razón de proporcionalidad, m .

Función constante: $y = n$

Se representa mediante una recta paralela al eje X . Su pendiente es 0.

La recta $y = 0$ coincide con el eje X .

Expresión general: $y = mx + n$

Su representación es una recta de pendiente m que corta al eje Y en el punto $(0, n)$. Al número n se le llama **ordenada en el origen**.

Por ejemplo:

La recta $^{\circ}\text{F} = 32 + 1,8 ^{\circ}\text{C}$ permite pasar de una temperatura en grados centígrados, $^{\circ}\text{C}$, a la correspondiente en grados Fahrenheit, $^{\circ}\text{F}$.

Actividades

1 Representa:

a) $y = 2x$ b) $y = \frac{2}{3}x$ c) $y = -\frac{1}{4}x$ d) $y = -\frac{7}{3}x$

2 Representa:

a) $y = 3$ b) $y = -2$ c) $y = 0$ d) $y = -5$

3 Representa:

a) $y = 2x - 3$ b) $y = \frac{2}{3}x + 2$
c) $y = -\frac{1}{4}x + 5$ d) $y = -3x - 1$

4 Un móvil, en el instante inicial, está a 3 m del origen y se aleja de este con una velocidad de 2 m/s.

Halla la ecuación de su posición en función del tiempo y represéntala.

5 El coste del uso doméstico de gas ciudad es de 12 € al bimestre más 0,05 € por cada kWh consumido.

Escribe la ecuación del coste bimensual, C , en función del número de kWh (E) de gas consumido.

La pendiente de la recta

$$3x - 2y + 1 = 0$$

es $m = \frac{3}{2}$.

Pendiente de una recta

La **pendiente** de una recta es la variación de la y (aumento o disminución) cuando la x aumenta una unidad.

Si conocemos las coordenadas de dos puntos de la recta, $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$, para hallar la pendiente, procedemos así:

$$\text{Pendiente} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \begin{array}{l} y_2 - y_1 \text{ es la variación de la } y. \\ x_2 - x_1 \text{ es la variación de la } x. \end{array}$$

La pendiente de una recta dada por su ecuación es el coeficiente de la x cuando está despejada la y .

Por ejemplo, observemos una tabla de valores correspondientes a $y = 2x + 1$:

x	0	1	2	3	4
y	1	3	5	7	9

Advertimos que *cuando la x avanza 1, la y sube 2*; es decir, la pendiente de la recta es 2.

Ecuación de una recta en la forma punto-pendiente

Con mucha frecuencia hemos de escribir la ecuación de una recta de la cual conocemos un punto y la pendiente. La damos a continuación.

Punto: $P(x_0, y_0)$ Pendiente: m Ecuación: $y = y_0 + m(x - x_0)$

Recta dada por dos puntos

Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, procedemos así:

- A partir de los dos puntos, obtenemos su pendiente.
- Con la pendiente y uno de los puntos, obtenemos la ecuación.

Ejercicio resuelto

Hallar la ecuación de cada una de las rectas siguientes:

a) Pasa por $(0, 4)$ y tiene una pendiente de $\frac{7}{3}$.

b) Pasa por $(-2, 7)$ y por $(4, 5)$.

a) $y = 4 + \frac{7}{3}x$. Observa que $(0, 4)$ está en el eje Y . Es decir, 4 es la ordenada en el origen.

b) Empezamos hallando su pendiente: $m = \frac{5 - 7}{4 - (-2)} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$

Ecuación de la recta que pasa por $(-2, 7)$ y cuya pendiente es $-\frac{1}{3}$:

$$y = 7 - \frac{1}{3}(x + 2)$$

Actividades

1 Halla la ecuación de cada una de las siguientes rectas:

a) Pasa por $(-3, -5)$ y tiene una pendiente de $\frac{4}{9}$.

b) Pasa por el punto $(0, -3)$ y tiene una pendiente de 4.

c) Pasa por $(3, -5)$ y por $(-4, 7)$.

2 Indica un punto y la pendiente de cada una de las rectas siguientes:

a) $y = -4 + 3(x - 1)$ b) $y = -2(x - 3)$ c) $y = 1 + 4x$

3 Parábolas y funciones cuadráticas

La curva que describe un balón cuando se lanza a canasta es una parábola. También describen parábolas las bolas de golf o los chorros de agua. Parabólicas son las secciones de las antenas que captan las emisiones de televisión procedentes de los satélites artificiales y las secciones de los faros de los coches. Y otros muchos objetos presentes en nuestra vida.

También hay muchas funciones que se representan mediante parábolas:

- El área de un cuadrado en función de su lado ($A = l^2$) o la de un círculo en función de su radio ($A = \pi r^2$).
- La altura a la que se encuentra una piedra que lanzamos hacia arriba en función del tiempo transcurrido desde que se lanzó ($a = v_0 t - 4,9 t^2$).
- El espacio que recorre un coche desde que decidimos frenar hasta que realmente se para, en función de la velocidad que llevaba ($e = 0,0074 v^2 + 0,21 v$).
- ...

Parábola tipo: la función $y = x^2$

Empecemos por representar el modelo de parábola más sencillo, que corresponde a la función $y = x^2$.

Se trata de una curva **simétrica** respecto al eje Y ; tiene un mínimo en el punto $(0, 0)$, al que llamamos **vértice**.

Tiene **dos ramas**, una decreciente y otra creciente.

Es una función **definida en todo $\mathbb{R}$** y **continua**, pues no presenta saltos: se puede representar de un solo trazo.

Como veremos a continuación, las gráficas de todas las demás funciones cuadráticas son similares a esta.

TABLA DE VALORES	
x	y
-4	16
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16

Otras parábolas

Observa las siguientes curvas con sus respectivas ecuaciones:

Puedes comprobar, en cada una de ellas, que las coordenadas de los puntos señalados cumplen las correspondientes ecuaciones.

Funciones cuadráticas

Las funciones $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, llamadas **cuadráticas**, se representan todas ellas mediante **parábolas** y son continuas en todo $\mathbb{R}$.

Cada una de estas parábolas tiene un eje paralelo al eje Y .

Su forma (hacia abajo, hacia arriba, más ancha...) depende de a , coeficiente de x^2 , del siguiente modo:

- Si $a > 0$, tienen las ramas hacia arriba, y si $a < 0$, hacia abajo.
- Cuanto mayor sea $|a|$, más estilizada es la parábola.

Entrenate

1 Representa las siguientes parábolas:

- $y = x^2 + 2$
- $y = x^2 - 3$
- $y = (x - 2)^2$
- $y = (x + 1)^2$

2 Representa las siguientes parábolas:

- $y = x^2 - 2x + 3$
- $y = x^2 - 6x + 5$

3 Dibuja estas funciones:

- $y = \frac{1}{4}x^2 + x - 2$
- $y = 2x^2 - 10x + 8$

Representación de funciones cuadráticas

Veamos algunos pasos que conviene dar para representar $y = ax^2 + bx + c$:

1.º La **abscisa del vértice** es $p = -\frac{b}{2a}$. Calculamos la ordenada.

2.º **Obtención de algunos puntos próximos al vértice.**

Calculamos el valor de la función en abscisas enteras próximas al vértice, a su derecha y a su izquierda. Así se obtiene la curva en su parte más interesante.

3.º **Puntos de corte con los ejes.**

— Corte con el eje X : se resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$.

— Corte con el eje Y : es el $(0, c)$.

4.º **Representación.**

Escogeremos sobre los ejes unas escalas que nos permitan plasmar la información en un espacio razonable.

Ejercicio resuelto

Representar $y = x^2 - 3x - 4$.

1.º Obtención del vértice:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Abscisa: } p = \frac{-(-3)}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2} = 1,5 \\ \text{Ordenada: } f(1,5) = -6,25 \end{array} \right\} \text{ El vértice es } (1,5; -6,25).$$

2.º Obtención de puntos próximos al vértice:

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

3.º Puntos de corte con los ejes:

• Cortes con el eje X :

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} \rightarrow x_1 = -1, x_2 = 4$$

• Corte con el eje Y : $(0, -4)$

(Esta información ya la teníamos en la tabla anterior)

4.º Puedes ver la representación a la izquierda.

Funciones de proporcionalidad inversa

De un rectángulo de 100 cm^2 de superficie, desconocemos sus lados. Los llamamos x e y . Es claro que $xy = 100$. Lo ponemos así:

$$y = \frac{100}{x} \quad (\text{A igualdad de áreas, los lados son inversamente proporcionales}).$$

Las relaciones de proporcionalidad inversa, como la que acabamos de describir, se presentan con mucha frecuencia en la naturaleza, la física, la economía... Vamos a analizarlas teóricamente.

Las funciones $y = \frac{k}{x}$ presentan las características siguientes:

- No están definidas en $x = 0$.
- Si x se acerca a 0, y toma valores cada vez más grandes. Por eso, decimos que el eje Y es una **asíntota**.
- Si x toma valores cada vez más grandes, y se acerca a 0. Por eso, el eje X es asíntota.

Esta curva es una **hipérbola**.

Funciones radicales

Las funciones $y = \sqrt{x}$ e $y = -\sqrt{x}$ se pueden representar punto a punto y dan lugar a las gráficas que ves debajo. Son mitades de parábola y juntas describen una parábola idéntica a $y = x^2$, pero con su eje sobre el eje X .

El dominio de definición de estas funciones es $[0, +\infty)$.

Actividades

1 Representa con detalle la parte positiva de la función $y = \frac{36}{x}$. Para ello, dale a x los valores 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 y utiliza una hoja de papel cuadrulado para representar los puntos obtenidos.

2 Representa la función $y = \frac{6}{x}$. Para ello, da a x los valores ± 1 , ± 2 , ± 3 y ± 6 .

3 Representa $y = \sqrt{x}$ y di su dominio de definición. (Da a x los valores 0, -1, -4, -9, -16).

4 Representa estas funciones y di sus dominios:

a) $y = \sqrt{x+1}$

(Da a x los valores -1, 0, 3, 8, 15).

b) $y = \sqrt{1-x}$

(Da a x los valores 1, 0, -3, -8, -15).

$y = 3^x$ crece más deprisa que $y = 2^x$.

■ Funciones exponenciales crecientes: $y = a^x$, $a > 1$

En el margen tienes la gráfica de la función exponencial de base 2: $y = 2^x$

$x \geq 0$:

x	0	1	2	3	4	...
2^x	1	2	4	8	16	...

Cuando x toma valores cada vez más grandes, 2^x tiende a infinito.

$x \leq 0$:

x	-1	-2	-3
2^x	$2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$	$2^{-2} = \frac{1}{4} = 0,25$	$2^{-3} = \frac{1}{8} = 0,125$

Cuando x toma los valores $-4, -5, -6, -10, \dots$, 2^x se hace muy pequeño. Es decir, hacia la izquierda, 2^x tiende a cero.

Se llaman **funciones exponenciales** a las que tienen la ecuación $y = a^x$.

- Todas ellas son continuas, están definidas en todo $\mathbb{R}$ y pasan por los puntos $(0, 1)$ y $(1, a)$.
- Si la base es mayor que 1 ($a > 1$), entonces son crecientes.
- Crecen tanto más rápidamente cuanto mayor es a .

■ Funciones exponenciales decrecientes ($0 < a < 1$)

La función $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ también es exponencial. Como su base $(1/2)$ es menor que 1, la función es decreciente.

Las funciones $y = a^x$ con $0 < a < 1$ también pasan por $(0, 1)$ y $(1, a)$, son continuas y definidas en todo $\mathbb{R}$, pero son decrecientes. Decrecen tanto más rápidamente cuanto más próximo a 0 sea a .

Actividades

- 1 Calcula los valores de la función $y = 1,5^x$ para los valores enteros de x comprendidos entre -6 y 6 . Representa la función.
- 2 Calcula los valores de la función $y = 0,8^x$ para los valores enteros de x comprendidos entre -8 y 8 . Representa la función.
- 3 La función $y = 5^{0,2x}$ puede ponerse de forma exponencial $y = a^x$ teniendo en cuenta que $5^{0,2x} = (5^{0,2})^x$.
  - a) Calcula $5^{0,2}$ y guarda el resultado en la memoria: $5 \text{ } \boxed{x^y} \text{ } 0,2 \text{ } \boxed{=}$ $\boxed{\text{Min}}$.
  - b) Representa la función dando valores a x . Por ejemplo, para $x = 4$: $\boxed{\text{MR}} \text{ } \boxed{x^y} \text{ } 4 \text{ } \boxed{=}$ $\boxed{3.62}$.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Pendiente de una recta

1 ▽ ▽ ▽ Halla gráficamente la pendiente de las rectas que pasan por los siguientes puntos:

- a) (2, 4) y (-1, -2)   b) (-3, 5) y (3, -1)
c) (-3, 5) y (2, 1)   d) (3, 2) y (5, 2)

2 ▽ ▽ ▽ Halla las pendientes de las siguientes rectas, obteniendo dos de sus puntos:

- a) $y = 4x - 2$ b) $y = -\frac{4}{5}x$
c) $y = \frac{5x}{4} + 3$ d) $y = 8 - 5x$

Comprueba, en cada caso, que coinciden con el coeficiente de la x (puesto que la y está despejada). ¿Qué relación existe entre el crecimiento o el decrecimiento de una recta y su pendiente?

3 ▽ ▽ ▽ Halla las pendientes de las siguientes rectas:

- a) $6x + 3y - 4 = 0$ b) $x + 4y - 2 = 0$
c) $-3x + 2y = 0$ d) $3y - 12 = 0$

Ecuación y representación de una función lineal

4 ▽ ▽ ▽ Asocia a cada recta su ecuación. Di, en cada caso, cuál es su pendiente.

- a) $y + 2 = 0$
b) $3x - y = 3$
c) $y = 2 - x$
d) $2x - 3y = 12$

5 ▽ ▽ ▽ Halla la ecuación de las rectas que cumplen las siguientes condiciones y dibújalas:

- a) Pasa por (5, 3) y tiene una pendiente de $3/5$.
b) Pasa por el punto (5, 3) y tiene pendiente $-1/2$.
c) Pasa por el punto (5, 6) y tiene la misma pendiente que la recta $2x + y = 0$.

6 ▽ ▽ ▽ Halla la ecuación de las rectas que pasan por los puntos que se indican y represéntalas:

- a) (2, 3) y (7, 0)
b) (-2, 5) y por el origen de coordenadas
c) (-3, 2) y (3, 2)
d) (0, 4) y (4, 0)

Funciones cuadráticas

7 ▽ ▽ ▽ Representa las siguientes funciones haciendo, en cada caso, una tabla de valores como esta, y di cuál es el vértice de cada parábola:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	...	...	...	...	...	...	...	...	...

- a) $y = x^2 + 3$ b) $y = x^2 - 4$
c) $y = 2x^2$ d) $y = 0,5x^2$

8 ▽ ▽ ▽ Representa las siguientes parábolas, hallando el vértice, algunos puntos próximos a él y los puntos de corte con los ejes:

- a) $y = (x + 4)^2$ b) $y = \frac{1}{3}x^2 + 2x$
c) $y = -3x^2 + 6x - 3$ d) $y = -x^2 + 5$

9 ▽ ▽ ▽ Di cuál es el punto (abscisa y ordenada) donde se encuentra el vértice de estas parábolas señalando, en cada caso, si se trata de un máximo o de un mínimo:

- a) $y = x^2 - 5$ b) $y = 3 - x^2$
c) $y = -2x^2 - 4x + 6$ d) $y = 3x^2 - 6x$

Representa cada una de esas parábolas.

10 ▽ ▽ ▽ Asocia a cada una de las gráficas una de las expresiones siguientes:

- a) $y = x^2$
b) $y = (x - 3)^2$
c) $y = x^2 - 3$
d) $y = x^2 - 6x + 6$

Otras funciones

11 ▽ ▽ ▽ Dibuja la gráfica de estas funciones, dando a x los valores que se indican en cada caso:

- a) $y = \frac{3}{x}$ $x = -3; -1; -1/2; 1/2; 1; 3$
- b) $y = -\frac{3}{x}$ $x = -3; -1; -1/2; 1/2; 1; 3$
- c) $y = \frac{1}{x-2}$ $x = -2; 0; 1; 3/2; 3; 4$
- d) $y = -\frac{1}{x+1}$ $x = -3; -2; -3/2; -1/2; 0; 1$

12 ▽ ▽ ▽ Representa las funciones siguientes:

- a) $y = \sqrt{x} + 2$ b) $y = 2 - \sqrt{x}$
- c) $y = \sqrt{3-x}$ d) $y = 2\sqrt{x+2}$

13 ▽ ▽ ▽ Representa las siguientes funciones dando a x valores comprendidos entre -4 y 4 :

- a) $y = 1,4^x$ b) $y = 0,75^x$
- c) $y = 2^x - 1$ d) $y = 0,5^x + 2$

14 ▽ ▽ ▽ Asocia a cada gráfica una de las fórmulas que aparecen debajo:

- I) $y = \frac{1}{2-x}$ II) $y = 3 - \frac{1}{x-3}$
- III) $y = 2 + \frac{2}{x}$ IV) $y = \frac{-1}{x+3}$

Resuelve problemas

15 ▽ ▽ ▽ Disponemos de 40 cm de cuerda con los que podemos construir cuadrados.

- a) Escribe la ecuación de la función que nos da el *perímetro* de un cuadrado construido con parte de esa cuerda o con toda ella, en función de su *lado*.
- b) Halla el dominio de definición de la función.
- c) Representa la función.

16 ▽ ▽ ▽ Ana corre una carrera popular de 10 km a una velocidad constante de 12 km/h. El pequeño David, que corre a 6 km/h, solo quiere hacer los últimos 5 km y llegar a la meta con Ana, así que sale desde el kilómetro 5. Los dos comienzan a correr a las 10:00 h de la mañana.

- a) ¿A qué hora estará Ana en el punto desde el que salió David? ¿A qué distancia de la salida estará David en ese momento?
- b) Dibuja, en los mismos ejes coordenados, la gráfica de cada recorrido.

17 ▽ ▽ ▽ Observa los datos de esta tabla:

ALTURA (m)	0	360	720	990
TEMPERATURA (°C)	10	8	6	4,5

- a) Representa los puntos en una gráfica.
- b) Suponiendo que se sigue la misma pauta, halla la expresión analítica de la función *altura-temperatura*.
- c) ¿A partir de qué altura la temperatura es menor que 0 °C?

18 ▽ ▽ ▽ Un fontanero cobra 18 € por el desplazamiento y 15 € por cada hora de trabajo.

- a) Haz una tabla de valores de la función *tiempo-coste* y represéntala gráficamente.
- b) Si ha cobrado por una reparación 70,50 €, ¿cuánto tiempo ha invertido en la reparación?

19 ▽ ▽ ▽ Un ciclista sale de excursión a un lugar que dista 20 km de su casa. A los 15 minutos de la salida, cuando se encuentra a 6 km, hace una parada de 10 minutos. Reanuda la marcha y llega a su destino una hora después de haber salido.

- a) Representa la gráfica *tiempo-distancia a su casa*.
- b) ¿Lleva la misma velocidad antes y después de la parada? (Suponemos que en cada etapa la velocidad es constante).

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

20 $\nabla\nabla\nabla$ ¿Cuál es la ecuación de la función que nos da el área de un cuadrado dependiendo de cuánto mida su lado? Haz su representación gráfica.

21 $\nabla\nabla\nabla$ La altura, h , a la que se encuentra en cada instante, t , una piedra que lanzamos verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s viene dada por: $h = 20t - 5t^2$

- Representa gráficamente la función.
- Di cuál es su dominio de definición.
- ¿En qué momento alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura?
- ¿En qué momento cae la piedra al suelo?
- ¿En qué intervalo de tiempo la piedra está a una altura superior a 15 metros?

22 $\nabla\nabla\nabla$ En el contrato de alquiler de un apartamento figura que el precio subirá un 5% anual.

- Si el precio es de 450 € mensuales, ¿cuál será dentro de 5 años?
- Escribe la función que da el precio del alquiler según los años transcurridos.

23 $\nabla\nabla\nabla$ Una furgoneta que costó 20 000 € se deprecia a un ritmo de un 12% anual.

- ¿Cuál será su precio dentro de 4 años?
- Halla la función que da el precio del vehículo según los años transcurridos.
- Calcula cuánto tiempo tardará el precio en reducirse a la mitad.

Autoevaluación

¿Manejas con destreza las funciones lineales?

- Escribe la ecuación de cada una de estas rectas:
  - Pasa por el punto $(1, -2)$ y tiene pendiente $3/2$.
  - Pasa por los puntos $(-2, -5)$ y $(1, 1)$.

2 Estas son las tarifas de dos compañías telefónicas:

A: 0,30 € por establecimiento de llamada y 0,20 €/min

B: 0,22 €/min

- ¿Cuánto cuesta una llamada de 5 minutos en cada compañía? ¿Y de 15 min? ¿Y de 20 min?
- Haz, para cada una de las dos compañías, la gráfica de la función que nos da el precio de la llamada dependiendo del tiempo que dure.

¿Conoces familias de funciones (cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales) y las representas a partir de sus ecuaciones, y viceversa?

3 Representa las siguientes funciones:

- $y = x^2 - 4$
- $y = x^2 + 4x - 5$
- $y = \frac{-1}{x}$
- $y = \frac{1}{x-3}$
- $y = \sqrt{-x+2}$
- $y = 2^x - 3$

4 Asocia a cada una de las gráficas una ecuación:

- $y = -x^2 - 4x - 3$
- $y = 1,5^x$
- $y = \frac{1}{x} + 1$
- $y = \sqrt{x+3}$

¿Asocias una situación real con algún modelo de función y te basas en él para interpretarla?

5 En el contrato de trabajo de un empleado figura que su sueldo subirá un 10% anual. Su sueldo inicial es de 24 000 € anuales.

- ¿Cuánto ganará dentro de 10 años?
- Escribe la función que relaciona el dinero que gana con el número de años transcurridos.

6 La semejanza.

Aplicaciones

El estudio teórico de la semejanza se suele basar en el teorema de Tales. Recordemos quién fue este personaje.

Tales nació en Mileto (actualmente, en la costa occidental de Turquía), aproximadamente, en el año 640 a.C. Murió con más de 90 años.

Visitó Egipto y, posiblemente, Babilonia, y aprendió la ciencia práctica acumulada durante siglos por estas civilizaciones. Aportó estos conocimientos, seguramente muy elaborados, al mundo griego.

Fue el primero que exigió que las afirmaciones matemáticas y de otras ciencias fueran avaladas por razonamientos bien fundamentados. Por eso, se le considera el fundador de la ciencia griega.

Muy admirado en su época y en siglos posteriores, se le dio el rango del primero de “los siete sabios de Grecia”. Esta gran admiración de la que fue objeto hizo que se le mitificara y se le atribuyeran méritos que realmente no eran suyos. Por ejemplo, la predicción de un eclipse. Y la paternidad del teorema que lleva su nombre.

Parece cierto que en Egipto midió la altura de una pirámide comparando su sombra con la que arrojaba, en el mismo instante, una vara vertical. Pero esta aplicación práctica de la semejanza no significa que diera forma al enunciado del teorema, ni mucho menos que lo demostrara.

Ambos logros, junto con una adecuada fundamentación y su desarrollo teórico de la semejanza, hay que atribuirse los a Euclides, dos siglos y medio posterior.

DEBERÁS RECORDAR

- Qué representan los planos, las maquetas y los mapas. Cómo se interpretan. Para qué sirven.

Dos figuras semejantes tienen la *misma forma*. ¿Cómo se manifiesta matemáticamente esta apariencia?

- Los ángulos correspondientes en figuras semejantes son iguales.
- Las longitudes de los segmentos correspondientes en figuras semejantes son proporcionales. La razón de proporcionalidad se llama **razón de semejanza**.

■ Figuras semejantes en la vida corriente

Estamos rodeados de reproducciones:

- Fotografías, vídeos, películas en pantallas de distintos tamaños...
- Maquetas de monumentos o de urbanizaciones, copias de cuadros famosos, reproducciones de coches...
- Planos de edificios o de ciudades, mapas...

Las primeras pretenden, exclusivamente, transmitir unas características que se conservan con la semejanza: la imagen, la forma, el color, la belleza del original.

Con los planos y los mapas pretendemos más: queremos que además de apreciar la forma, se puedan obtener con precisión medidas, distancias. Por ello, van acompañados de una **escala** con la que se pueden obtener magnitudes de la realidad midiendo sobre su reproducción (plano o mapa).

Escala es el cociente entre cada longitud de la reproducción (mapa, plano, maqueta) y la correspondiente longitud en la realidad. Es, por tanto, la **razón de semejanza** entre la reproducción y la realidad.

Una escala 1:200 significa, como ya sabes, que 1 cm del plano corresponde a 200 cm = 2 m de la realidad.

La expresión 1:200 puede ponerse así: $\frac{1}{200}$, con lo que se muestra la razón de semejanza entre las dos figuras.

■ Relación entre las áreas y entre los volúmenes

Si la razón de semejanza entre dos figuras es k , la razón entre sus áreas es k^2 y la razón entre sus volúmenes es k^3 .

La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza.

La razón entre los volúmenes de dos figuras semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza.

Si una maqueta está a escala 1:200, la razón entre la superficie de una parcela y la de su representación es $200^2 = 40\ 000$. Y la razón entre el volumen de un edificio y el de su representación en la maqueta es $200^3 = 8\ 000\ 000$.

Entrénate

- 1** Una parcela con forma de cuadrilátero irregular tiene 820 m^2 de área y su lado menor mide 40 m. Hacemos un plano de la parcela en el que el lado menor mide 16 cm. ¿Cuál será el área de la parcela en el plano?
- 2** La razón entre las áreas de dos rectángulos semejantes es $9/16$. Si el perímetro del menor es 138 m, ¿cuál será el perímetro del mayor?
- 3** Queremos hacer una maqueta a escala 1:25 de un barco que mide 9 m de largo. La superficie de la cubierta es de 21 m^2 y el volumen del casco es $31,5\text{ m}^3$. ¿Cuáles serán estas medidas en la maqueta?
- 4** Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 cm y 16 cm. ¿Cuál será el área de otro semejante cuya hipotenusa mide 85 cm?
- 5** Las áreas de los círculos máximos de dos esferas son $100\pi\text{ cm}^2$ y $16\pi\text{ cm}^2$. ¿Cuál será la razón entre sus radios? ¿Y la razón entre los volúmenes de las dos esferas?

Ejercicio resuelto

El dibujo adjunto representa la maqueta de una urbanización a escala 1:500.

Sobre la maqueta se han tomado las siguientes medidas:

$$\text{POLIDEPORTIVO} \begin{cases} \text{largo} = 30 \text{ cm} \\ \text{ancho} = 18 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\text{DEPÓSITO CILÍNDRICO} \begin{cases} \text{diámetro} = 6 \text{ cm} \\ \text{altura} = 10 \text{ cm} \end{cases}$$

CARPA: diámetro = 16 cm

Para construir la carpa de la maqueta se han necesitado 402 cm^2 de tela.

En el depósito de la maqueta caben 283 cm^3 de arena.

Hallar:

- La superficie total del polideportivo.
- El volumen del depósito.
- La superficie y el volumen de la carpa, en la realidad.

Dimensiones en la realidad:

$$\text{POLIDEPORTIVO} \begin{cases} \text{Largo} = 30 \text{ cm} \times 500 = 15\,000 \text{ cm} = 150 \text{ m} \\ \text{Ancho} = 18 \text{ cm} \times 500 = 9\,000 \text{ cm} = 90 \text{ m} \end{cases}$$

$$\text{DEPÓSITO} \begin{cases} \text{Radio} = 3 \text{ cm} \times 500 = 1\,500 \text{ cm} = 15 \text{ m} \\ \text{Altura} = 10 \text{ cm} \times 500 = 5\,000 \text{ cm} = 50 \text{ m} \end{cases}$$

$$\text{CARPA: Radio} = 8 \text{ cm} \times 500 = 4\,000 \text{ cm} = 40 \text{ m}$$

$$\text{a) Superficie del polideportivo} = 150 \text{ m} \times 90 \text{ m} = 13\,500 \text{ m}^2$$

$$\text{b) Volumen del depósito} = \pi r^2 h = \pi \cdot 15^2 \cdot 50 = 35\,342,9 \text{ m}^3$$

También se puede calcular a partir del volumen del depósito en la maqueta:

$$\begin{aligned} V_{\text{depósito real}} &= V_{\text{depósito maqueta}} \cdot 500^3 = 283 \text{ cm}^3 \cdot 500^3 = \\ &= 35\,375\,000\,000 \text{ cm}^3 = 35\,375 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{c) Superficie de la carpa} = \frac{1}{2} 4\pi r^2 = 2\pi \cdot 40^2 = 10\,053,1 \text{ m}^2$$

También se puede calcular a partir de la superficie en la maqueta:

$$\begin{aligned} S_{\text{carpa real}} &= S_{\text{carpa maqueta}} \cdot 500^2 = 402 \text{ cm}^2 \cdot 500^2 = \\ &= 100\,500\,000 \text{ cm}^2 = 10\,050 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Volumen de la carpa} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi 40^3 = 134\,041,3 \text{ m}^3$$

Actividades

- Un edificio de la maqueta anterior tiene forma de ortoedro. Sus dimensiones son $9 \text{ cm} \times 6,4 \text{ cm}$ de planta y 4 cm de altura. Halla las dimensiones, el área de la fachada y el volumen en la realidad.
  - La superficie de un campo de fútbol sala en la maqueta es de 32 cm^2 . ¿Cuál es la superficie en la realidad?
  - Una caseta de la maqueta está hecha con $0,3 \text{ cm}^3$ de poliexpán. ¿Cuál es su verdadero volumen?
  - La altura de un edificio en la realidad es 65 m . ¿Cuál es su altura en la maqueta?
- La Luna está a $384\,000 \text{ km}$ de nosotros y su diámetro es $3\,500 \text{ km}$.

  - Calcula su superficie y su volumen.
  - El Sol está a $150\,000\,000 \text{ km}$ de nosotros. Y su tamaño aparente es igual que el de la Luna. Según esto, halla el diámetro del Sol. Halla también su superficie y su volumen a partir de las correspondientes magnitudes de la Luna.

2 Semejanza de triángulos

Teorema de Tales

Si las rectas a , b y c son paralelas y cortan a otras dos rectas r y s , entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales.

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}} \quad \text{Como consecuencia, se verifica: } \frac{\overline{AB}}{\overline{AB'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}}$$

También ocurre lo recíproco: si los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ son proporcionales a $\overline{A'B'}$ y $\overline{B'C'}$ y las rectas a y b son paralelas, entonces la recta c es paralela a ellas.

El teorema de Tales sirve para estudiar la semejanza de triángulos.

Triángulos semejantes

Dos **triángulos semejantes** tienen:

- Sus lados proporcionales:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \text{razón de semejanza}$$

- Sus ángulos, respectivamente iguales:

$$\hat{A} = \hat{A}', \hat{B} = \hat{B}', \hat{C} = \hat{C}'$$

Triángulos en posición de Tales

Los triángulos ABC y $AB'C'$ tienen un ángulo común, el $\hat{A}$. Es decir, el triángulo pequeño está encajado en el grande.

Además, los lados opuestos a $\hat{A}$ son paralelos.

Decimos que esos dos triángulos están en **posición de Tales**.

Dos triángulos en posición de Tales son semejantes.

Actividades

- 1 Las medidas de este dibujo son:

$$\overline{AB} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\overline{BC} = 1,5 \text{ cm}$$

$$\overline{B'C'} = 2,4 \text{ cm}$$

Aplica el teorema de Tales y calcula la longitud de $A'B'$.

- 2 Para aplicar el teorema de Tales, trazamos por A una recta paralela a b y a c :

Calcula x .

Entrénate

En el triángulo rectángulo ABC conocemos $\overline{AB} = 9$ cm y $\overline{AC} = 26$ cm. A 6 cm del vértice C cortamos el triángulo CDE de forma que DE sea paralela a AB . Halla el área del trapecio $ADEB$.

Criterio de semejanza de triángulos rectángulos

Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen igual uno de sus ángulos agudos.

Esto es así, pues con ese ángulo y el ángulo recto ya son dos los ángulos iguales y, por tanto, también será igual el tercero.

Por ejemplo:

$$\left. \begin{aligned} 90^\circ + 35^\circ + \alpha &= 180^\circ \\ 90^\circ + 35^\circ + \beta &= 180^\circ \end{aligned} \right\} \rightarrow \alpha = \beta$$

Consecuencias del criterio de semejanza anterior

Todos los triángulos obtenidos al trazar perpendiculares a alguno de los lados de un ángulo son semejantes.

Todos esos triángulos ($ABO, A'B'O, A''B''O$) son semejantes por tener el ángulo α común.

Por tanto, sabemos, sin más comprobación (por el criterio anterior), que sus lados son proporcionales.

$$\frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OB'}} = \frac{\overline{OA''}}{\overline{OB''}} \qquad \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OB'}} = \frac{\overline{A''B''}}{\overline{OB''}}$$

En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa determina dos triángulos semejantes al original.

En la figura II encontramos tres triángulos rectángulos: ABC, AMB y AMC .

— ABC y AMB son semejantes por compartir el ángulo $\hat{B}$.

— ABC y AMC son semejantes por compartir el ángulo $\hat{C}$.

Veamos algunos ejemplos de aplicaciones del criterio de semejanza en triángulos rectángulos.

Problemas resueltos

1. Para medir la altura de un edificio, Miguel se sitúa de modo que ve alineados la parte alta de la verja y la del edificio. Señala su posición y toma las medidas que se ven en el dibujo.

a) Explicar por qué los triángulos ABC y ADE son semejantes.

b) Calcular ED y la altura del edificio.

a) Los triángulos ABC y ADE son semejantes por ser rectángulos con un ángulo agudo igual, $\hat{A}$.

$$b) \frac{ED}{CB} = \frac{AD}{AB} \rightarrow \frac{ED}{3 - 1,6} = \frac{2 + 7}{2} \rightarrow ED = \frac{9 \cdot 1,4}{2} = 6,3 \text{ m}$$

La altura del edificio es $6,3 + 1,6 = 7,9 \text{ m}$.

2. Hallar el volumen de un tronco de cono de 9 cm de altura sabiendo que los radios de sus bases miden 20 cm y 8 cm.

2.

Ampliamos el tronco hasta completar un cono. Llamamos x al incremento de la altura. Tenemos en cuenta la semejanza de los dos triángulos: el pequeño, de catetos 8 y x ; y el grande, de catetos 20 y $x + 9$:

$$\frac{x}{8} = \frac{x + 9}{20} \rightarrow 20x = 8x + 72 \rightarrow 12x = 72 \rightarrow x = 6 \text{ cm}$$

El volumen del tronco de cono es la diferencia de volúmenes de dos conos:

$$V_{\text{TRONCO}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 20^2 \cdot (9 + 6) - \frac{1}{3} \pi \cdot 8^2 \cdot 6 = \frac{1}{3} \pi (6000 - 384) = 5881,06 \text{ cm}^3$$

Actividades

1 Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 7,22 m en el momento en que un poste de 1,60 m da una sombra de 67 cm.

2 Halla los lados del triángulo ABC .

3 En el mismo instante y lugar de la actividad 4, ¿qué longitud tendrá la sombra de un edificio que mide 32 m de altura?

4 Si la altura de Rita es 1,65 m, ¿cuál es la altura de la farola?

Definición

Se llama homotecia de centro O y razón k a una transformación que hace corresponder a cada punto P otro P' tal que:

- O, P y P' están alineados.
- $\overline{OP'} : \overline{OP} = k$

Dos figuras homotéticas son semejantes de razón $|k|$.

Es una **homotecia** de centro O y razón 2.

La homotecia es una transformación que produce figuras semejantes. La razón de semejanza es igual a la razón de homotecia. Si dos figuras son homotéticas, sus segmentos correspondientes son paralelos.

Observa cómo se aplica la homotecia para construir un rectángulo áureo a partir de una hoja A-4, teniendo en cuenta que el D.N.I. es un rectángulo áureo.

Recuerda que un rectángulo se llama áureo si su lado mayor se obtiene multiplicando el menor por Φ . El número $\Phi = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ se llama número áureo.

En el dibujo de la izquierda se ve cómo un chico ayuda a una chica a “tapar” la luna con una moneda. En esa situación, la moneda y el disco de la Luna son figuras homotéticas. Es una homotecia en el espacio, pues los discos están en planos distintos. El centro de la homotecia es el ojo de la chica.

Observa cómo utiliza la chica de la derecha este mismo procedimiento para comprobar si “aquella ventana que ve allí enfrente” es un rectángulo áureo: la compara con su D.N.I., mediante una homotecia con centro en su ojo.

Actividades

- 1 En el procedimiento descrito arriba para obtener una hoja de papel con dimensiones áureas a partir de una A-4 y con la ayuda del D.N.I., se aplica una homotecia. ¿Cuál es su centro? ¿Y su razón?

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Figuras semejantes

- 1 $\nabla\nabla\nabla$ ¿Cuáles de estas figuras son semejantes? ¿Cuál es la razón de semejanza?

- 2 $\nabla\nabla\nabla$ a) ¿Son semejantes los triángulos interior y exterior?

- b) ¿Cuántas unidades medirán los catetos de un triángulo semejante al menor cuya razón de semejanza sea 2,5?

- 3 $\nabla\nabla\nabla$ Una fotografía de 9 cm de ancha y 6 cm de alta tiene alrededor un marco de 2,5 cm de ancho. ¿Son semejantes los rectángulos interior y exterior del marco? Responde razonadamente.

- 4 $\nabla\nabla\nabla$ Un joyero quiere reproducir un broche como el de la figura duplicando su tamaño.

- a) Haz un dibujo de la figura ampliada.
b) Calcula su superficie.

- 5 $\nabla\nabla\nabla$ Un rombo cuyas diagonales miden 275 cm y 150 cm, ¿qué área ocupará en un plano de escala 1:25?

- 6 $\nabla\nabla\nabla$ Una maqueta está hecha a escala 1:250. Calcula:

- a) Las dimensiones de una torre cilíndrica que en la maqueta mide 6 cm de altura y 4 cm de diámetro.
b) La superficie de un jardín que en la maqueta ocupa 40 cm^2 .
c) El volumen de una piscina que en la maqueta contiene 20 cm^3 de agua.

- 7 $\nabla\nabla\nabla$ En un mapa de escala 1:1 500 000, la distancia entre dos poblaciones es de 2 cm.

- a) ¿Cuál es la distancia real?
b) ¿Qué distancia habrá en el plano entre dos ciudades que distan 180 km?

- 8 $\nabla\nabla\nabla$ Esta figura es el logotipo de una empresa automovilística. Quieren reproducirlo de forma que ocupe 54 cm^2 de superficie. ¿Cuáles serán sus dimensiones? Dibújalo.

- 9 $\nabla\nabla\nabla$ ¿Cuánto medirán los lados de un trapecio semejante al de la figura, cuyo perímetro sea 163,2 cm?

- 10 $\nabla\nabla\nabla$ a) Copia esta figura en tu cuaderno y amplíala al doble tomando O como centro de homotecia.
b) Redúcela a $1/3$ tomando A como centro de homotecia.

- 11 $\nabla\nabla\nabla$ Halla el centro y la razón de homotecia que transforma la figura $ABCDE$ en $A'B'C'D'E'$.

Semejanza de triángulos

12 ▽ ▽ ▽ El perímetro de un triángulo isósceles es 49 m y su base mide 21 m. Halla el perímetro de otro triángulo semejante, cuya base mide 4 m. ¿Cuál es la razón de semejanza entre el triángulo mayor y el menor?

13 ▽ ▽ ▽ En el triángulo ABC hemos trazado DE paralelo a CB .

¿Por qué son semejantes los triángulos ABC y ADE ? Calcula $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$.

14 ▽ ▽ ▽ ¿Por qué son semejantes los triángulos ABC y AED ?

Halla el perímetro del trapecio $EBCD$.

15 ▽ ▽ ▽ Observa esta figura, en la que el segmento AB es paralelo a CD .

a) Di por qué son semejantes los triángulos OAB y ODC .

b) Calcula x e y .

16 ▽ ▽ ▽ En un triángulo rectángulo, la relación entre los catetos es $3/4$. Halla el perímetro de otro triángulo semejante en el que el cateto menor mide 54 cm.

17 ▽ ▽ ▽ La razón de semejanza entre dos triángulos es $2/5$. Si el área del mayor es 150 cm^2 , ¿cuál es el área del menor?

18 ▽ ▽ ▽ El perímetro de un triángulo isósceles es 64 m, y el lado desigual mide 14 m. Calcula el área de un triángulo semejante cuyo perímetro es de 96 m.

Aplica lo aprendido

19 ▽ ▽ ▽ En una carretera de montaña, nos encontramos una señal que nos advierte que la pendiente es del 8%; es decir, por cada 100 m que recorremos, el desnivel es de 8 m.

a) ¿Cuál es el desnivel que se produce cuando recorremos 3 km?

b) Para que el desnivel sea de 500 m, ¿cuántos kilómetros tendremos que recorrer?

20 ▽ ▽ ▽ Esta figura representa, a escala 1:2 000, una parcela de terreno. Calcula su perímetro y su área, tomando las medidas necesarias.

21 ▽ ▽ ▽ Dos triángulos ABC y PQR son semejantes. Los lados del primero miden 24 m, 28 m y 34 m. Calcula la medida de los lados del segundo triángulo sabiendo que su perímetro es 129 m.

22 ▽ ▽ ▽ Los lados mayores de dos triángulos semejantes miden 8 cm y 13,6 cm, respectivamente. Si el área del menor es 26 cm^2 , ¿cuál es el área del mayor?

Resuelve problemas

23 ▽ ▽ ▽ ¿Cuál es la profundidad de un pozo, si su anchura es 1,2 m y alejándote 0,8 m del borde, desde una altura de 1,7 m, ves que la visual une el borde del pozo con la línea del fondo?

24 ▽ ▽ ▽ Entre dos pueblos A y B hay una colina. Para medir la distancia $\overline{AB}$, fijamos un punto P desde el que se ven los dos pueblos y tomamos las medidas:

$\overline{AP} = 15 \text{ km}$, $\overline{PM} = 7,2 \text{ km}$ y $\overline{MN} = 12 \text{ km}$. (MN es paralela a AB). Calcula la distancia $\overline{AB}$.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

- 25** $\nabla\nabla\nabla$ Una lámpara situada a 25 cm de una lámina cuadrada de 20 cm de lado, proyecta una sombra sobre una pantalla paralela que está a 1,5 m de la lámpara.

¿Cuánto mide el lado del cuadrado proyectado?

- 26** $\nabla\nabla\nabla$ Queremos construir un ortoedro de volumen $36\,015\text{ cm}^3$ que sea semejante a otro de dimensiones $25 \times 15 \times 35\text{ cm}$. ¿Cuánto medirán sus aristas?

- 27** $\nabla\nabla\nabla$ Para hacer un embudo de boca ancha, hemos cortado un cono de 5 cm de radio a 3 cm del vértice. La circunferencia obtenida tiene 2 cm de radio. Halla el volumen del embudo.

- 28** $\nabla\nabla\nabla$ Hemos recubierto con un tejado cónico un depósito cilíndrico de 4 m de radio y 14,4 m de altura. Si el radio del cono es 10 m, ¿cuál es el volumen de la zona comprendida entre el cono y el cilindro?

- 29** $\nabla\nabla\nabla$ La base de una escultura tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular en el que los lados de las bases miden 80 cm y 140 cm, y su altura, 150 cm. Halla su volumen.

- 30** $\nabla\nabla\nabla$ Halla el volumen de una maceta como la de la figura, en la que los radios de las bases miden 6 cm y 14 cm, y la generatriz, 30 cm.

Autoevaluación

¿Manejas la semejanza de figuras para obtener medidas de una a partir de la otra?

- 1** Queremos hacer una maqueta de un jardín rectangular a escala 1:400. Su perímetro es de 850 m, y su área, de $37\,500\text{ m}^2$. ¿Cuáles serán estas medidas en la maqueta?

¿Conoces las condiciones que se deben comprobar para asegurar que dos triángulos son semejantes?

- 2** Comprueba si son semejantes dos triángulos ABC y $A'B'C'$ que cumplen las condiciones siguientes:

- a) $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 18$; $\overline{CA} = 12$
 $\overline{A'B'} = 25$; $\overline{B'C'} = 45$; $\overline{C'A'} = 30$
 b) $\overline{AB} = 20$; $\overline{BC} = 30$; $\overline{CA} = 40$
 $\overline{A'B'} = 40$; $\overline{B'C'} = 50$; $\overline{C'A'} = 60$
 c) $\hat{A} = 58^\circ$; $\hat{B} = 97^\circ$
 $\hat{A}' = 58^\circ$; $\hat{C}' = 35^\circ$

¿Utilizas con soltura la semejanza para resolver problemas?

- 3** Álvaro debe situarse a 3 m de un charco para ver la copa de un árbol reflejada en él. Si la distancia del charco al árbol es de 10,5 m y la estatura de Álvaro es de 1,72 m, ¿cuál es la altura del árbol?

- 4** Un centro comercial P está situado entre dos vías paralelas r y s . Se quiere unir, mediante carreteras, con las poblaciones A , B , C y D . Con los datos de la figura, calcula x e y .

- 5** Un florero tiene forma de tronco de pirámide de bases cuadradas de 8 cm y 12 cm de lado, y altura 16 cm. Calcula su volumen.